

STATLOCK®

Fichia Téanica



Indicación

Dispositivo de fijación StatLock® está diseñado para la estabilización segura de sondas vesicales en calibres de 8 a 26 Fr. maximizando su cuidado y eficiencia durante la estancia en el paciente.



Contenido

El envase incluye el sistema de estabilización del StatLock® y parches para la preparación de la piel.



Sistema de estabilización

Broche giratorio de 360° que asegura y estabiliza la sonda vesical reduciendo complicaciones por la tracción, tensión y fricción ocasionada por movimiento del paciente.



Liberable

El broche tiene un mecanismo de apertura y bloqueo intuitivo que facilita la limpieza, revisión o cambio de sonda en el paciente.



Compatibilidad y gentileza

Hipoalergénico de la larga duración, libre de látex con respaldo reforzado de Tricot y adhesivo de acrilato amigable al contacto con la piel del paciente.



Etiquetado

Cuenta con una etiqueta de registro Impresa en el rnismo facilitando el registro del procedimiento.



📆 Protección de piel

Protector cutáneo en forma de dos toallitas estériles que maximiza el estándar de cuidado y eficiencia en la adhesión, creando una fina capa en la superficie de la piel que la protege de irritación o lesiones cutáneas.

Para los más pequeños: Fijador pediátrico con forma de osito, con respaldo de espuma suove y adhesivo de acrilato gentil con la piel, hipoalergénico y libre de látex para el confort de los pacientes más pequeños.



Estéril en:


Óxidoetileno.



Aspectos técnicos

Contenido	el envase incluye el sistema de estabilización del StatLock® y parches para la preparación de la piel.
Referencias	VFDSSP Fijador para Sonda Foley 2 vías Pediátrico calibres 8 a 10 Fr FOL0102 Fijador para Sonda Foley 2 vías Adulto calibres 12 a 26 Fr. 25
Presentación	Caja x 25 unidades
Vida útil	3 años
Registro sanitario	INVIMA 2023DM-0027101
Tipo de dispositivo	NO INVASIVO
Riesgo	I





BD Colombia Calle 97 # 23-60 Piso 9 Ed. Torre Proksol Tel: (571) 7566060



Consideraciones acerca de la seguridad y eficacia:

El dispositivo StatLock® es para un solo uso exclusivamente.

Esterilizado con óxido de etileno. Deseche el producto sí el envase está abierto o dañado.

No altere el dispositivo **StatLock**® ni los componentes. El procedimiento tiene que ser realizado por personal con formación y que conozca las referencias anatómicas, las técnicas seguras y las complicaciones posibles. **SIN LÁTEX**



Contraindicaciones:

Alergias conocidas a los adhesivos o esparadrapos.



Advertencias y precauciones:

1. No utilice el dispositivo StatLock® donde pueda producirse una pérdida de adherencia, como puede suceder

con un paciente confuso, con un dispositivo de acceso desatendido, o sobre piel diaforética o no adherente.

- **2.** Observe las precauciones universales para la manipulación de sangre y líquidos corporales, y los procedimientos de control de infecciones durante la aplicación y la extracción del dispositivo **StatLock**®.
- 3. Manipule el catéter lo menos posible durante la aplicación y extracción del dispositivo StatLock®.
- 4. Mantenimiento diario
- a. El dispositivo StatLock® debe evaluarse a diario y cambiarse cuando esté clínicamente indicado, al menos cada siete días.
- **b.** Si se ensucia el parche, lávelo con jabón/agua, salino o peróxido de hidrógeno. No use alcohol ni sistemas de baño pre-envasados, que podrían hacer que se despegara prematuramente.
- c. Si se ducha/baña, cúbralo con un protector de plástico o un vendaje resistente al agua.
- d. Evalúe la piel antes de aplicarlo y repita esto a diario conforme al protocolo del centro.
- e. Siga el juicio clínico al retira el dispositivo de estabilización del StatLock® si el paciente experimenta algún cambio de líquidos que podría afectar a la integridad de la piel.

Tel: (571) 7566060