

0 - 12 meses



## PEPTI JUNIOR

**Registro sanitario**  
RSA-0009420-2019

**Categoría**  
**MIPRES - 1701**

Fórmulas especiales para niños  
(lactantes, niños de corta edad  
y niños).

### Descripción

Alimento para propósitos médicos especiales. Fórmula oligomérica con proteína de suero extensamente hidrolizada, con carbohidratos, sin lactosa, con grasa vegetal, triglicéridos de cadena media - TCM (50%), ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga (LCPs), vitaminas, minerales, oligoelementos y nucleótidos. Para el manejo nutricional de lactantes de 0-12 meses con alergia a la proteína de leche de vaca - APLV (leve y moderada) con manifestaciones gastrointestinales, síndrome de malabsorción (SMA) secundario a APLV, malabsorción intestinal y síndrome de intestino corto, que no puedan suplir sus requerimientos nutricionales con una alimentación convencional.

0 - 12 meses



## Indicaciones

- Alergia a la Proteína de Leche de Vaca APLV (leve y moderada) con manifestaciones gastrointestinales.
- Síndrome de malabsorción (SMA) secundario a APLV
- Malabsorción intestinal
- Síndrome de intestino corto

## Concentración

\*12,8% P/V


## Características

- 50% TCM
- Con 5 nucleótidos
- Sin lactosa
- Baja osmolaridad
- Con ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga:
  - DHA y AA en relación 1:1
  - EPA

|                                      |                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fuente de proteínas</b>           | Concentrado de proteína hidrolizada de suero (de leche)                                                                                                                |
| <b>Fuente de Carbohidratos</b>       | Sólidos de jarabe de maíz                                                                                                                                              |
| <b>Fuente de Lípidos</b>             | Triglicéridos de cadena media, mezcla de aceites vegetales (aceite de colza, aceite de girasol, aceite de palma, aceite alto en ácido araquidónico), aceite de pescado |
| <b>Distribución Calórica</b>         | Proteínas: 11%<br>Carbohidratos: 41%<br>Lípidos: 48%                                                                                                                   |
| <b>Osmolaridad (mOsm/L)</b>          | 190*                                                                                                                                                                   |
| <b>Osmolalidad (mOsm/kg de agua)</b> | 210*                                                                                                                                                                   |

## Preparación\*

A 30 mL de agua previamente hervida adicionar 1 cuchara medidora a ras (4,26 g de polvo)



## Información Nutricional

| Energía y Nutrientes                     | Unid. | Por 100 g | Por 100 kcal | Por 100ml 12,8% P/V |
|------------------------------------------|-------|-----------|--------------|---------------------|
| <b>Valor energético</b>                  | kcal  | 515       | 100          | 66                  |
|                                          | kJ    | 2155      | 420          | 275                 |
| <b>Proteína equivalente (11%E)</b>       | g     | 14        | 2,7          | 1,8                 |
| <b>Grasas totales</b>                    | g     | 27,3      | 5,3          | 3,5                 |
| <b>TCM (48% del total de las grasas)</b> |       |           |              |                     |
| Grasas saturadas                         | g     | 15        | 2,9          | 1,9                 |
| Grasas monoinsaturadas                   | g     | 6,2       | 1,2          | 0,8                 |
| Grasas poliinsaturadas                   | g     | 4,4       | 0,9          | 0,6                 |
| Ácido linoleico                          | mg    | 3550      | 690          | 455                 |
| Ácido α-linolénico                       | mg    | 692       | 134          | 89                  |
| Ácido Araquidónico (AA)                  | mg    | 52        | 10           | 6,7                 |
| Ácido Docosahexaenoico (DHA)             | mg    | 52        | 10           | 6,7                 |
| Ac. grasas trans                         | g     | 0         | 0            | 0                   |
| <b>Carbohidratos</b>                     | g     | 53,4      | 10           | 6,8                 |
| Azúcares                                 | g     | 8,2       | 1,6          | 1,0                 |
| Fibra dietaria                           | g     | 0         | 0            | 0                   |

## Vitaminas, minerales y oligoelementos

|                                 |         |      |      |      |
|---------------------------------|---------|------|------|------|
| Vitamina A                      | mcg RE  | 405  | 79   | 52   |
| Vitamina C                      | mg      | 73   | 14   | 9,3  |
| Vitamina D                      | mcg     | 9,8  | 1,9  | 1,3  |
| Vitamina E                      | mg-α-TE | 8,1  | 1,6  | 1,0  |
| Vitamina K                      | mcg     | 37   | 7,2  | 4,7  |
| Vitamina B1 (Tiamina)           | mcg     | 387  | 75   | 50   |
| Vitamina B2 (Riboflavina)       | mcg     | 773  | 150  | 99   |
| Vitamina B3 (Niacina)           | mg NE   | 3,4  | 0,65 | 0,43 |
| Vitamina B5 (Ácido pantoténico) | mcg     | 2578 | 500  | 330  |
| Vitamina B6 (Piridoxina)        | mcg     | 309  | 60   | 40   |
| Vitamina B9 (Ácido fólico)      | mcg     | 70   | 14   | 8,9  |
| Vitamina B12 (Cobalamina)       | mcg     | 1,4  | 0,27 | 0,18 |
| Biotina                         | mcg     | 13   | 2,6  | 1,7  |
| Sodio                           | mg      | 140  | 27   | 18   |
| Potasio                         | mg      | 507  | 98   | 65   |
| Cloruro                         | mg      | 310  | 60   | 40   |
| Calcio                          | mg      | 390  | 76   | 50   |
| Fósforo                         | mg      | 218  | 42   | 28   |
| Magnesio                        | mg      | 40   | 7,7  | 5,1  |
| Hierro                          | mg      | 6    | 1,2  | 0,77 |
| Zinc                            | mg      | 3,9  | 0,76 | 0,5  |
| Cobre                           | mcg     | 314  | 61   | 40   |
| Yodo                            | mcg     | 93   | 18   | 12   |
| Selenio                         | mcg     | 14   | 2,8  | 1,8  |
| Manganeso                       | mcg     | 244  | 47   | 31   |
| Colina                          | mg      | 79   | 15   | 10   |
| L-Carnitina                     | mg      | 8,3  | 1,6  | 1,1  |
| Taurina                         | mg      | 41   | 8,0  | 5,3  |
| Inositol                        | mg      | 26   | 5,1  | 3,3  |
| Nucleótidos                     | mg      | 25   | 4,9  | 3,2  |

Material destinado exclusivamente para los representantes de visita médica de DANONE BABY NUTRITION COLOMBIA S.A.S. y profesionales de la salud. a) La leche materna es el mejor alimento para el niño. b) Si no se siguen estrictamente las indicaciones de preparación e higiene, el alimento proporcionado es perjudicial para la salud del niño. c) La utilización del biberón incide negativamente en la calidad y cantidad de la lactancia materna. d) Utilícese bajo recomendación del profesional de la salud.

Los alimentos para propósitos médicos especiales deben ser utilizados bajo supervisión del profesional de la salud. DANONE respalda la recomendación mundial de la OMS sobre la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y la continuación de la lactancia hasta dos años y más, combinada con la introducción segura de alimentos complementarios apropiados.