

leche de vaca descremada, aceites vegetales refinados (aceite y/o de palma), aceite de nuez, aceite monocelular (aceite de vaca), caseinato (de leche de vaca), jarabe de leche de vaca, carbonato de calcio, hidrogenofosfato de magnesio, L-ascorbico, L-tigefeno, L-ascorbato de sodio, taurina, L-ascorbato de DL-alfa tocoferil, nicotinamida, DL-alfa tocoferil, sulfato de cobre, sulfato de manganeso, clorhidrato de L-ascorbico, riboflavina, ácido pterilmonoglútamico, L-ascorbato de sodio, flocanadina, D-biotina, selenito de sodio.

Ingredientes de leche de vaca y nueces.

Indicaciones: No utilizar por vía parenteral. Utilizar por vía oral como nutrición complementaria para niños a partir de un mes de edad.

Alimento seco y protegido de la luz solar. Tapar siempre el envase, consumir en un periodo no mayor a un mes. Fecha de caducidad: 04/2014. Fecha de fabricación: 04/2014. País de origen: Alemania.

por:

E. Paso 28.

Alimento para el niño. Si no se siguen estrictamente las instrucciones de uso, el alimento promocionado es perjudicial.



Precauciones: Este producto debe ser consumido únicamente por niños a partir de un año de edad y adultos con trastornos del metabolismo de ácidos grasos de cadena larga, quilibrio y linfangiectasia intestinal.

Ingesta recomendada: La cantidad de producto y la dilución debe determinarse el profesional de la salud y depende de la edad, el peso y la situación clínica del individuo. La concentración recomendada es de 16,8% PV (p.ej. 16,8 g de producto en un volumen final de 100 mL). La osmolalidad y osmolaridad a esta concentración (16,8% PV) es 240 mOsm/kg H₂O y 240 mOsm/L, respectivamente.

Preparación:

LA SALUD DE LA PERSONA DEPENDE QUE SIGA CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN Y USO. UNA PREPARACIÓN INCORRECTA PUEDE PERJUDICAR AL INDIVIDUO.

Utilizar únicamente la cuchara medidora incluida en la lata. Cada cuchara medidora necesita 30 mL de agua para obtener la concentración recomendada (16,8% PV).

1. Lavarse las manos y limpiar el área de preparación, esterilizar recipientes y herramientas.
2. Hervir agua fresca y esperar por lo menos 30 minutos para que se enfríe y así la leche esté caliente en la muñeca. Verter la cantidad requerida de agua dentro del recipiente esterilizado.
3. Utilizar la cuchara medidora de Monogen hasta el tope (no más de lo que cabe en la cuchara).
4. Adicionar el número indicado de cucharas medidoras de Monogen y agitar hasta disolver el polvo. Antes de alimentar, asegúrese que el preparado esté a la temperatura correcta, dejando caer unas cuantas gotas en la muñeca.
5. Si el producto permanece en el recipiente después de una hora de alimentar, debe ser desechado. El alimento preparado no debe ser recalentado.



Aviso importante: Alimento para propósitos médicos especiales en polvo no estéril, que debe ser preparado inmediatamente antes de alimentar. Agite el alimento antes de usarlo. El alimento no debe ser calentado más de 15 minutos antes de ser consumido. No hierva el alimento y no use microondas para calentarlo.

Advertencia sobre higiene bucal: Durante la administración no permita el contacto prolongado o frecuente del preparado con los dientes del niño(a). Es importante una buena higiene bucal después de la última toma por la noche. Pida consejo a su médico o dentista.