

IMPORTANTE: LA LECHE MATERNA ES EL MEJOR ALIMENTO PARA EL NIÑO. Si no se siguen estrictamente las instrucciones de preparación e higiene, éste o cualquier otro alimento, es perjudicial para la salud del niño. La utilización del biberón puede interferir en la calidad y cantidad de la lactancia materna. Los alimentos para propósitos médicos especiales deben ser utilizados bajo la supervisión del profesional de la salud. DANONE respalda la recomendación mundial de la OMS sobre la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida y la continuación de la lactancia hasta los dos años y más, combinada con la introducción segura de alimentos.

Utilizar sólo bajo supervisión médica. No utilizar por vía parenteral. Utilizar por vía oral y/o utilizar por sonda. No debe utilizarse como única fuente de alimentación. Debe administrarse en combinación con una fuente proteica y de otros nutrientes, en las cantidades recomendadas por el profesional de la salud, para cubrir los requerimientos nutricionales.

LA SALUD DEL NIÑO DEPENDE DE SEGUIR CUIDADOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN Y USO. LA PREPARACIÓN INCORRECTA PUEDE SER PERJUDICIAL PARA LA SALUD. EMPLEE SIEMPRE UTENSILIOS LIMPIOS Y ESTERILIZADOS PARA EVITAR EL RIESGO DE CONTAMINACIÓN.

Preparación: Se recomienda preparar la fórmula inmediatamente antes de la alimentación y consumirse en la siguiente hora. La preparación que se prepara con antelación debe ser refrigerada y consumirse antes de 24 horas. Después de transcurrido el tiempo, el producto preparado debe desecharse. No hierva la preparación ni use microondas para calentarla.

Medida: Se recomienda utilizar el medidor suministrado. Cada medida del cacito de 50 mL aporta 34 g de polvo. La cantidad de producto y la cantidad de agua a añadir debe ser determinada por el médico y depende de la edad, el peso y la situación clínica de la persona. Añadir a la cantidad indicada del producto la cantidad de agua y mezclar añadiendo gradualmente agua hasta alcanzar el volumen deseado. Es recomendable preparar la fórmula con una disolución 1:7 (p.ej. 100 g de polvo más 700 mL de agua) osmolalidad de 490 mOsmol/kg H₂O y concentrarla hasta una disolución 1:5 (p.ej. 100 g de polvo en 500 mL de agua) osmolalidad de 690 mOsmol/kg H₂O. Las presentaciones son orientativas. Puede tomarse más concentrado, pero en este caso debe ser acompañado con agua si se consume. Se recomienda tomarlo frío.

Energía: 3.05 kcal/g

320 mOsmol (Dilución recomendada 1:5)
440 mOsmol (Dilución recomendada 1:7)

Conservación: El producto debe mantenerse bien cerrado, sellado y almacenado en un lugar fresco, seco y protegido de la luz. No almacenar a temperaturas extremas. Una vez abierto, colocar nuevamente la tapa después de cada uso y consumir en un periodo máximo de un mes.

CONSUMIR EL PRODUCTO ÚNICAMENTE SI EL ENVASE Y ETIQUETA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO.

Distribuido en Colombia por:
DANONE S.A.S.
Calle 100 No. 100-100, Torre E, Piso 28,
Bogotá, Colombia
Teléfono: 011-4903150-2017



10293835
120828



Verificar el código de barras y lote en la parte inferior de la lata