

Nutrilon® PEPTI JUNIOR

Preparación recomendada:

90 ml de agua + 3 cucharas medidoras (12.8 g) = 100 ml del producto reconstituido. 1 cucharita medidora = 4.26 g. La cantidad de alimento y la dilución debe ser determinada únicamente por el profesional de la salud y depende de la edad, peso corporal y condición médica del niño.

Instrucciones de preparación e higiene:

Cumpla las instrucciones para la preparación de Nutrilon® Pepti Junior. Evite la contaminación durante la apertura, manipulación y uso. No seguir las instrucciones puede significar un riesgo para la salud del lactante. Se recomienda el consumo del producto reconstituido inmediatamente después de preparado. **No usar microondas, esto puede causar severas quemaduras.**



1 Lave bien sus manos y limpie todos los utensilios involucrados en la preparación. Esterilice todos los utensilios, hirviéndolos en agua potable durante 10 minutos.



2 Hierva agua potable durante 5 minutos; déjela enfriar. Vierta la cantidad de agua hervida, indicada por el profesional de la salud, en el recipiente esterilizado.



3 Llene la cucharita medidora incluida en la lata del producto y llévela a ras, nivelando el polvo con un cuchillo limpio y seco. Utilice únicamente la cucharita medidora incluida en la lata. Conserve la cucharita medidora limpia y seca dentro de la lata. Agregue el número prescrito de cucharas medidoras de polvo al agua.



4 Agite hasta que el polvo esté completamente disuelto. Verifique la temperatura del alimento y utilícelo durante las siguientes dos horas de preparado. La fórmula que no sea consumida después de dos horas de reconstitución, debe desecharse. Lave todos los utensilios después de ser usados.

La fórmula puede presentar un sabor ligeramente y característico en este tipo de productos, por extensamente hidrolizadas.

Almacenamiento:

El envase cerrado debe mantenerse en un lugar fresco, seco y refrigerar. Después de realizar la preparación, lavar la lata y el envase, consuma el producto en un plazo máximo de un día. Consumido el producto, no reutilizar. Producto embotado bajo

Densidad energética: 0.66 kcal/ml (A la concentración recomendada)

Osmolaridad: 190 mOsm/L (A la concentración recomendada)

Carga renal potencial de solutos: 147 mOsm/L (A la concentración recomendada)

Utilizar solo bajo supervisión médica.

No utilizar por vía parenteral. Utilizar por vía oral o utilizar por sonda.

Advertencia sobre salud dental: asegúrese de realizar un lavado de boca después de cada toma. Pida consejo a su profesional de salud y odontólogo.

AVISO IMPORTANTE:

LA LECHE MATERNA ES EL MEJOR ALIMENTO PARA EL NIÑO. Las indicaciones de preparación e higiene, el alimento prematizado, la utilización del biberón incide negativamente en la salud. Los alimentos para propósitos médicos especiales deben ser utilizados bajo la supervisión de un profesional de la salud. DANONE respalda la recomendación mundial de la OMS durante los primeros seis meses de vida y la continuación combinada con la introducción segura de alimentos complementarios.



Fecha de vencimiento y N° de lote: ver en la base de la lata

