

Preparación Recomendada

Cada cucharita medidora (4.6 g) de NUTRILON® PEPTI SYNEO™ requiere 30 mL de agua para lograr la dilución recomendada (13.8% P/V). La tabla a continuación muestra diferentes opciones de preparación para conseguir la dilución recomendada. El profesional de la salud deberá calcular el aporte nutricional adecuado individualizado, teniendo en cuenta la edad, el peso y la condición médica del niño. Siga las recomendaciones del profesional de la salud.

Cantidad de agua a añadir (mL)	Cantidad de Pepti Syneo	Volumen final (mL)
90	3 cucharas medidoras = 13.8g	100
150	5 cucharas medidoras = 23.0g	166
240	8 cucharas medidoras = 36.8g	266

Instrucciones para su uso:

- Lave bien sus manos y limpie todos los utensilios involucrados en la preparación. Esterilice todos los utensilios, hirviéndolos en agua potable durante 10 minutos.
- Hierve agua potable durante 5 minutos; déjela enfriar. Vierta la cantidad de agua hervida, indicada por el profesional de la salud, en el recipiente esterilizado.
- Utilice únicamente la cucharita medidora incluida en la lata y lívela a ras, nivelando el polvo con un utensilio limpio, esterilizado y seco. Agregue el número prescrito de cucharas medidoras de polvo al agua y conserve la cucharita medidora limpia y seca dentro de la lata.
- Agite hasta que el polvo esté completamente disuelto. Verifique la temperatura del alimento y utilícelo durante las siguientes dos horas de preparado. La fórmula que no sea consumida después de dos horas de reconstituida, debe desecharse. Lave todos los utensilios después de ser usados.

Advertencia: Si no se siguen estrictamente las indicaciones de preparación e higiene, este o cualquier otro alimento, es perjudicial para la salud del niño. Se recomienda que todas las tomas sean preparadas en el momento de consumirlas.

Una vez comenzada la alimentación si no se consume el alimento preparado en su totalidad, deseche el sobranante. No hierva la fórmula y no use microondas para calentar la fórmula; esto puede causar severas quemaduras y limitar los beneficios del probiótico *Bifidobacterium breve* M16V. Calentar a baño María, antes de servir y controlar la temperatura antes de ofrecerse al lactante. Utilice el producto únicamente si el ped off (tapa de aluminio) se encuentra en buenas condiciones. Producto no estéril. CONSULTE CON EL PROFESIONAL DE LA SALUD.

Nutrilon® PEPTI SYNEO™ alimento

Densidad energética: 0.65 kcal/mL (A la concentración recomendada)
Osmolaridad: 250 mOsmVL (A la concentración recomendada)
Carga renal potencial de solutos: 148 mOsmVL (A la concentración recomendada)

Precauciones: Utilizar solo bajo supervisión médica. No utilizar por sonda. No se recomienda para lactantes con catéter venoso central, tubo de alimentación o todos los riesgos y beneficios por parte del profesional de la salud.

Importante: Nutrilon® PEPTI SYNEO™ se separa al administrarlo, agite bien la fórmula preparada. La fórmula normal y característico en este tipo de productos, por lo tanto, **CONSUMIR EL PRODUCTO ÚNICAMENTE SI EL B**

LA LECHE MATERNA ES EL MEJOR ALIMENTO PARA EL BEBÉ. El profesional de la salud es quien debe aconsejar el uso de la leche materna. Si la lactancia no es suficiente, la leche materna debe ser utilizada bajo supervisión del profesional de la salud. OMS sobre lactancia materna exclusiva durante los primeros dos años y más, combinada con la introducción segura de otros alimentos.

Advertencia sobre salud dental: asegúrese de recibir el consejo a su profesional de salud y odontólogo.



DANONE

Fecha de vencimiento y N° de lote: Ver en la parte inferior de la lata.



8 718117