

PREPODYNE SCRUB

JABÓN GERMICIDA A BASE DE YODO CONTROLADO

REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2010M-003759-R3

DESCRIPCION

Preparación germicida quirúrgica líquida a base de "Yodo Controlado" para el lavado de manos de personal médico y paramédico, curaciones y preparación pre y post operatoria del paciente. Su acción microbicida es efectiva sobre bacterias Gram+, Gram-, hongos, virus, esporas, levaduras, y organismos patógenos en general.

RECOMENDACIONES DE USO

LAVADO DE MANOS: retire todos los objetos que tenga en las manos, humedézcalas y aplique 5 cm³ de PREPODYNE SCRUB y comience a limpiar uña con uña o con palillo, continúe con cada dedo en forma circular pasando al siguiente una vez la tonalidad del PREPODYNE SCRUB cambie a espuma amarillo oro; luego frote los espacios interdigitales, continúe frotando enérgicamente palma con palma y palma con dorso y termine hasta 5 cm por encima de la muñeca frotando en forma circular. Recuerde no avanzar en el lavado hasta cerciorarse que la tonalidad de PREPODYNE SCRUB haya cambiado a amarillo oro. Enjuague con abundante agua hasta que no queden restos del PREPODYNE SCRUB. Al finalizar seque con toalla limpia y seca.

LAVADO QUIRURGICO DE MANOS SIN CEPILLO: igual al procedimiento anterior teniendo la precaución de extender el lavado por el antebrazo hasta 5 cm por debajo del codo, siempre en forma circular y de la parte distal a la proximal sin devolverse y sin dejar escurrir. Enjuague con cuidado de forma que el agua corra de las manos hacia los codos, sin bajarlas y seque con compresa estéril.
Tiempo de lavado: 5 minutos.

CURACIONES: lave previamente sus manos, colóquese los guantes, observe la herida y proceda así: En heridas limpias lávelas con agua estéril o solución salina. En heridas contaminadas humedezca una gasa con PREPODYNE SCRUB y frote en forma circular, sin devolverse, y de la parte aséptica a la séptica verificando el cambio de color amarillo oro, enjuague con agua estéril hasta retirar restos del producto, para proteger el tejido de granulación.

PREPARACION DE LA PIEL: horas previas a la cirugía, el paciente debe realizarse baño corporal y hacerle antisepsia con PREPODYNE SCRUB al sitio donde se hará la incisión, la remoción del vello debe ser limitada a la zona quirúrgica y una potencial extensión de ésta sin producir laceraciones o escoriaciones de la piel, realizándose sólo momentos antes de la intervención para evitar el crecimiento de bacterias.



PREPODYNE SCRUB

JABÓN GERMICIDA A BASE DE YODO CONTROLADO

REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2010M-003759-R3

La preparación operatoria de la piel del paciente se realiza en el quirófano, iniciando el procedimiento con PREPODYNE SCRUB en el punto central del sitio en donde se realizará la incisión del centro a la periferia, utilizando gasa impregnada del PREPODYNE SCRUB o con el guante directamente sobre la piel.

No avance hasta cerciorarse que el PREPODYNE SCRUB cambia su tonalidad a amarillo oro y ésta no varíe más. Deje para lo último las áreas de alta contaminación como: ombligo, axilas, regiones inguinales y periné. Retire el exceso de producto con compresa estéril según la técnica convencional establecida.

MODO DE APLICACION

Para lavado de manos aplique directamente sobre la piel y frote en forma circular, de la parte distal a la proximal.

En lavado de piel aplique la cantidad necesaria esparciéndola del centro a la periferia.

En curaciones realice el procedimiento utilizando la técnica convencional establecida.

DOSIFICACIÓN

Para lavado de manos utilice 5 cm³ del PREPODYNE SCRUB.

En preparación de piel utilice la cantidad necesaria según el área en donde se realice la antisepsia. En curaciones aplique 5 cm³ aproximadamente teniendo en cuenta el tamaño de la herida, si es necesario aplique más PREPODYNE SCRUB.

Al ser aplicado se produce una espuma amarillo oro la cual permanece mientras dura el efecto microbicida.

Si al realizar el lavado esta espuma se torna blanca, realice un lavado nuevamente.

Enjuague con abundante agua, haga énfasis en los espacios interdigitales, región inguinal y pliegues. Lave sus manos antes y después de cada procedimiento.

Al realizar la curación en heridas abiertas, enjuague el PREPODYNE SCRUB con agua estéril, para así favorecer el proceso normal de cicatrización.

En la preparación de la piel para intervenciones quirúrgicas, se puede realizar la incisión, aún con la presencia del PREPODYNE SCRUB.

Si se retira completamente el PREPODYNE SCRUB, aplique atomización de PREPODYNE SOLUTION en el sitio donde se realizará la incisión.

PREPODYNE SCRUB

JABÓN GERMICIDA A BASE DE YODO CONTROLADO

REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2010M-003759-R3

COMPOSICION GARANTIZADA

Cada 100 ml de producto contiene	
	2.1 g
Complejo Ácido Yodhídrico Yodo.....	
Ácido Yodhídrico.....	1.08 g
Esta fórmula aporta 0.75% de Yodo disponible	
Excipientes.....	100 mL

PROPIEDADES FISICOQUIMICAS

PROPIEDAD	VALORES STD	METODO
Densidad	0.95 - 1.17 g/ mL	picnómetro
% DE YODO	0.675-0.9	Titulación
pH	5.5 - 7.5	potenciométrico

ORGANISMO	CONCENTRACIÓN INHIBIDORA MÍNIMA PPM
Staphylococcus epidermis	1 min.
Staphylococcus aureus	1 min.
Staphylococcus aureus resistente a los antibióticos)	1 min.
Streptococcus pyogenes	1 min.
Corynebacterium diphtheriae	30 seg.
Serratia marcescens	30 seg.
Escherichia coli	30 seg.
Salmonella typhosa	30 seg.
Salmonella choleraesuis	30 seg.
Proteus vulgaris	30 seg.
Pseudomonas aeruginosa	30 seg.
Shigella sonnei	30 seg.
Candida albicans	30 seg.

PREPODYNE SCRUB

JABÓN GERMICIDA A BASE DE YODO CONTROLADO

REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2010M-003759-R3

ALMACENAMIENTO

- Almacenar en condiciones normales.
- Manténgase en el recipiente original y cerrado adecuadamente
- Manténgase en lugar fresco y bien ventilado alejado de temperatura extrema y de los rayos directos del sol.

CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- No esterilice.
- Evite el contacto del producto con los ojos. En caso de contacto lávese con abundante agua; acuda al médico