

Descripción

Aplicador con solución estéril fabricado en polipropileno de alta densidad, con solución de Gluconato de Clorhexidina (CHG) al 2% + Alcohol Isopropílico (IPA) al 70%, con tinte naranja (color amarillo # 6). Avalado por la FDA.

Composición

Consta de una esponja libre de látex unida a un mango cilíndrico, que contiene ampolla(s) hermética de vidrio (Borosilicato UPS Tipo 1 con triple Pared).

Indicaciones

Aplicador con solución estéril para la antisepsia cutánea y preparación quirúrgica de piel.

Características

Acción Rápida: Elimina una amplia variedad de microorganismos residentes en la piel.

Efecto residual persistente: Mantiene su acción antiséptica documentada de 48 horas.

Amplio Espectro: Es efectivo contra bacterias Gram positivas y Gram negativas, incluyendo *Sthaphylococcus aureus* resistente a Metilina (SARM) y *Enterococcus* resistente a vancomicina (ERV), *Clostridium Difficile*, *Acinetobacter*, la mayoría de los virus y hongos. Activo en presencia de bioproductos ricos en proteínas.

Técnica: Los aplicadores estériles y desechables, eliminan el contacto directo con la zona de preparación, contribuyendo a reducir la contaminación cruzada.

Esponja de Fricción: La consistencia de la esponja para fricción suave, garantiza que la solución penetre las 5 primeras capas de la piel donde reside el 80% de los microorganismos

Etiquetado y embalaje

El producto viene embalado en:

1. Caja de cartón de 8.4" X 8.4" contenida con 25 aplicadores de la **referencia: 665715.**
2. Caja de cartón de 13.2" X 13.2" contenida con 25 aplicadores de la **referencia: 665815.**

Almacenaje

- Almacenar en un lugar fresco y seco.
- Condiciones de almacenamiento: de 15 a 30°C (59-86°F). Almacenar en condiciones no recomendadas hace que se presenten cambios en el tinte naranja.
- Evite el frío o calor excesivo, superior a 40°C (104°F).

Precauciones

- Solo para uso externo sobre la piel.
- No usar en menores de 2 meses de edad.
- Evitar el contacto con membranas mucosas, ojos.
- Si la solución entra en contacto debe lavarse inmediatamente con abundante agua.
- Evitar su uso en heridas abiertas. Evitar el contacto con el tejido Neural y Oído Medio.
- Solución inflamable.
- No cubra la zona a intervenir o use una fuente de Electrocauterio hasta que la solución este completamente seca (tiempo de secado: 1 a 3 minutos).