

INFORMACION GENERAL No. de Ficha FA-577 Grupo de Marca 12500 CUTIMED® SILTEC® SORBACT® - APÓSITO DE ESPUMA DE ADHESIÓN BACTERIANA -Descripcion APÓSITO ABSORBENTE ESTÉRIL Registro Sanitario o INVIMA 2013DM-0010438 Notificación Sanitaria País Fabricante Alemania COLOCACIÓN DE STICKER TÉCNICO LEGAL, SE DEBE DE ACONDICIONAR LA UNIDAD Acondicionamiento o INDIVIDUAL. (PLEGADIZA) Reproceso requerido UNIDAD DE VENTA INDIVIDUAL Se Debe Acondicionar CAJA CORRUGADA SUBEMPAQUE UNIDAD Sticker Tecnico Legal N/A SI SI Código de Barras N/A N/A SI Condiciones de El sticker debe ser ubicado en un lugar donde no cubra informacion del empaque del producto. Acondicionamiento

VIDA UTIL A PARTIR DE LA FECHA DE FABRICACION									
Pre-vencimiento (Años)	1½								
Vencimiento (Años)	3								

COMENTARIOS DE LOGÍSTICA							
Ninguno							
Se incluye fotos en ANEXO							

Ficha de Acondicionamiento y Logística de Producto

Información del Sticker Técnico Legal

CUTIMED® SILTEC® SORBACT® - APÓSITO DE ESPUMA DE ADHESIÓN BACTERIANA - APÓSITO

ABSORBENTE ESTÉRIL

Fabricado por: BSN Medical GmbH, Alemania

Importado y distribuido por: BSN MEDICAL LIMITADA

Cra. 36 No. 13-451 Yumbo-Valle, Colombia Reg. San. INVIMA 2013DM-0010438

Composición: Película de Poliuretano elástico y azul, tela tejida de Acetato color verde impregnada con un ester derivado de acido graso DACC (Cloruro de Dialquilcarbamoilo), espuma de Poliuretano de color blanco con partículas superabsorbentes, adhesivo de silicona grado médico, película de Polietileno transparente y en relieve

Indicaciones y usos: Apósito estéril indicado para heridas contaminadas, colonizadas e infectadas con niveles moderados a elevados de exudado, tales como heridas crónicas (úlceras venosas y arteriales, úlceras diabéticas y úlceras por presión), heridas dehiscentes de postoperatorio y heridas traumáticas. Precauciones y advertencias: no utilizar con soluciones oxidantes como el peróxido de hidrógeno o hipoclorito, no utilizar en combinación con ungüentos o cremas, ya que puede interferir con la eficacia aglutinadora bacteriana del apósito. Este producto no está diseñado para ser cortado y evite sobreponer dos o más apósitos. Contraindicaciones: no aplicar sobre heridas secas y no utilizar en pacientes con sensibilidad o alergias conocidas a cualquiera de los componentes del producto. Solo para uso externo.

Condiciones de almacenamiento: consérvese en un lugar fresco, seco, protegido de la luz directa del sol y a temperatura no mayor a 25 °C.Método de desecho: el apósito no debe ser arrojado a fuentes de agua, depositarlo en el recipiente indicado para desechos sólidos.

UTILIZAR UNA SOLA VEZ



- 11		INFORMACION LOGISTICA DEL GRUPO DE MARCA		Dimensiones (milimetros)									Datos Logisticos								
П	INI OKWACION LOGISTICA DEL GROPO DE WARCA			Caja Corrugada			Subempaque			Unidad		Pesos (Gramos)			Codigos de barras			Contenido Uds			
	BNR	NART	Descripcion	Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto	Largo	Ancho	Alto	Caja	Subempaque	Unidad	Caja	Subempaque	Unidad	Caja	Caja Subempa Individua	
ſ	73251-00	73251-00000-00	CMED SLC SOR STE 7.5X7.5CM 10 INT.	394	298	200	N/A	N/A	N/A		74	165	1.557	N/A	113	4042809607055	4042809607048	4042809706895	100	10	1
Ī	73251-01	73251-00001-00	CMED SLC SOR STE 12.5X12.5CM 10 INT.	405	389	244	N/A	N/A	N/A	188	74	209	2.857	N/A	222	4042809607079	4042809607062	4042809706901	100	10	1
I	73251-03	73251-00003-00	CMED SLC SOR STE 17.5X17.5CM 5 INT.	413	360	294	N/A	N/A	N/A	240	49	326	2.895	N/A	225	4042809607116	4042809607109	4042809703412	50	5	1
L	73251-03	73251-00003-00	CMED SLC SOR STE 17.5X17.5CM 5 INT.	413	360	294	N/A	N/A	N/A	240	49	326	2.895	N/A	225	4042809607116	4042809607109	4042809703412	50	5	_

		REVISADO PO	R		Fecha			Revision				
					Dia	Mes	s Año	No				
	JULIAN CANDELA			DIANA MARCELA I	MONTES							
	COORDINAD	ORA TECNICA Y ASUI	NTOS REGULATORIOS	GERENTE TECNICO Y ASUNTOS REGULATORIOS								
Fecha				Fecha		Fecha			27	05	2020	5
Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año	Dia	Mes	Año				



CMED SLC SOR STE 7.5CMX7.5CM 10 INT.

ACONDICIONAMIENTO DE LA PLEGADIZA



CUTIMIEDS SILTECS SORBACTS - APÓSITO DE ESPUNA DE ADHESIÓN BA CTERIANA - APÓSITO ABSORBANTE ESTÉRIL.

Fabricado por ESN Medical GmbH, Alemania Importado y distribuido por BSN MEDICAL LINISTA DA

Composición. Película de Poliurelano elastico y azul tela rejida de Acetato color verde impregnada con un ester
tetrivado de acido graso DACO (Cotrora de Dialquileratamolio), espuma de Poliurelano de color blanco con
particulas superabsorbenes achesivo de silicona grado médico, película de Polietileno transparente y en refleve
grado médico indisciones y usos. Apostro estánt indicado para hendras contaminadas, coloricadas e infectadas
con invelas moderados a elevados de exudado, tales como heridas crónicas (ulceras venosas y arreirales viceras
sidabilitas y ulceras por presión), heridas debicamenes de postoperaturio y handas atramáticas. Precauciones y
advenerioas no utilizar con soluciones ovidames como el peróvido de hidrógeno o hipocloriot, no utilizar en
combinación con uniquentos co-cremas y a que puede interfair con la eficacia agiliundador bacteriam del agóstico.
Este producto no está diseñado para ser cortado y evite sobreponer dos o mas agósticos Contraindicaciones no
aplicar sobre heridas secas y no utilizar en pacificas de como porte de la producto. Solo para uso externo. Condiciones de almacenamiento: conserves en un lugar
fiesco esco, portegido de la lucerica del solo y la emperatura no mayor za 25° CMedio de desesso.


UTILIZAR UNA SOLA VEZ

ACONDICIONAMIENTO DEL SOBRE



MEDIDAS DEL STICKER DEL SOBRE: 8,0 cm X 4,0 cm

CMED SLC SOR STE 12.5CMX12.5CM 10 INT.



ACONDICIONAMIENTO DE LA PLEGADIZA

MEDIDAS DEL STICKER DE LA PLEGADIZA: 8,0 cm X 4,0 cm



Cutimbos sil rece sorbación. A Pósito De Esfulha De ADRESIÓN BACTERIANA - A PÓSITO ABSORBENTE ESTÉRIL Fabricado por IBBN Nedicial Ombit. Alamanía Importado y distribudo por IBBN NEDICAL LIMITADA Cr. 38 No. 13-451 Yumbo-Valla. Colombis Reg. San. INVIMA 2013 DM-0010438

Composición: Película de Pollutratano elástico y acut. Istale tajús de Acatato color verde impregnada con un ester derivado de acido graso DACC (Cloruro de Dialquilicarbamolio), espoma de Pollutrano de color blanco con particulas superabsorbantes adhesivo de silicona grado médico, película de Policitano transparente y en relieve grado médico, película de Policitano transparente y en relieve grado médico, indicaciones y usca. Apósito setári indicado para heridas contaminadas. colorizadas el infectadas con invelas moderados a elevados de avudado, tales como heridas crónicas (ulcaras venosas y anteriales. Ulcaras diabeticas y ulcaras por presión) heridas delasticantes de postoperación y heridas serva s'exambicas. Presudones y advarsancias. no utilizar en osoluciones os used interferir con el eficial el aguindas de bacterio no está diseñado para ser cortado y exite sobreponer dos más apósitos. Contrandicaciones no applicar sobre heridas seas y no utilizar en acionidas con una comisca a utaliquiar de los componentes del producto. Solo pere uso enterno. Condiciones de almacenamiento: conseñeses en un lugar fresco, aco, provagido de la tudi enter de las jos a temperatura mon anyor a 25° Cheldo de desenho el apósito no debe ser errojado a fuentes de agua depositario en el recipiente indicado para desechos sólidos. UTILIZAR UNA SOLA VEZ

MEDIDAS DEL STICKER DE LA PLEGADIZA: 8,0 cm X 4,0 cm

ACONDICIONAMIENTO DEL SOBRE



MEDIDAS DEL STICKER DEL SOBRE: 8,0 cm X 4,0 cm

CMED SLC SOR SAC STE 17.5CMX17.5CM 5 INT



ACONDICIONAMIENTO DE LA PLEGADIZA



ACONDICIONAMIENTO DEL SOBRE



MEDIDAS DEL STICKER DE LA PLEGADIZA: 8,0 cm X 4,0 cm

MEDIDAS DEL STICKER DEL SOBRE: 8,0 cm X 4,0 cm