

Janumet 50/1000 Sitagliptina 50 mg 56 Comprimidos





Janumet 50/1000 Sitagliptina 50 mg 56 Comprimidos

Medicamentos antihiper glucémicos con mecanismos de acción complementarios para mejorar el control glucémico en pacientes con diabetes tipo 2: Sitagliptina fosfato, un inhibidor de la dipeptidil peptidasa (DPP-4) y Metformina clorhidrato, un miembro de la clase de las biguanidas.

Beneficios

Janumet contiene dos medicamentos distintos, llamados Sitagliptina y Metformina. La Sitagliptina pertenece a una clase de medicamentos denominados inhibidores de la DPP-4 (inhibidores de la dipeptidil peptidasa-4). La Metformina pertenece a una clase de medicamentos denominados biguanidas. Actúan conjuntamente para controlar los niveles de azúcar en la sangre en pacientes adultos con una forma de diabetes llamada "diabetes mellitus tipo 2". Este medicamento ayuda a aumentar los niveles de insulina producida después de una comida y reduce la cantidad de azúcar producida por su cuerpo. Junto con la dieta y el ejercicio, este medicamento le ayuda a bajar su nivel de azúcar en la sangre. Este medicamento se puede usar sólo o con ciertos medicamentos para la diabetes (insulina, sulfonilureas o glitazonas).

Principales principios activos

- Sitagliptina.
- Metformina.



Modo de uso

Tome un comprimido: dos veces al día por vía oral con alimentos para reducir la probabilidad de que sienta molestias en el estómago. Puede que su médico tenga que aumentar la dosis para controlar los niveles de azúcar en la sangre. Si usted tiene una función renal reducida, su médico le puede recetar una dosis menor. Debe continuar con la dieta recomendada por su médico durante el tratamiento con este medicamento y tener cuidado de que la ingesta de hidratos de carbono se distribuya por igual durante el día. Es poco probable que el tratamiento solo con este medicamento le produzca una bajada anormal del azúcar en sangre (hipoglucemia). Se puede producir una bajada del azúcar en sangre cuando este medicamento se toma junto con un medicamento que contenga sulfonilurea o con insulina, por lo que, es probable que su médico considere necesario reducir la dosis de su sulfonilurea o insulina.

¿Cuál es la mejor hora para tomar Janumet?

Lo ideal es tomarla 2 veces al día, con los alimentos (desayuno y cena), aunque estrictamente no hay contraindicación para tomarse previo a los mismos. También le sugiero un adecuado plan de alimentación, con al menos 3 comidas al día, siendo las principales el desayuno y la comida.