

FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE**MESTINON®**
Comprimidos 60 mg

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

COMPOSICION:

Cada comprimido contiene:

- Bromuro de piridostigmina 60,0 mg
- Excipientes: Dióxido de silicio coloidal, Lactosa anhidra, ácido esteárico.

PRESENTACION:

Mestinon se encuentra disponible en cajas conteniendo ~~20 y 100~~ **XX** comprimidos.

CLASIFICACION:

Antimiasténico - Anticolinesterásico

¿Qué es Mestinon?

Mestinon contiene el ingrediente activo bromuro de piridostigmina, que pertenece al grupo de las medicinas conocidas como inhibidores de colinesterasa. Este medicamento ayuda en el paso de los mensajes del cerebro a los músculos, haciendo que los músculos funcionen en la forma adecuada.

¿En qué casos se ingiere Mestinon?

Los médicos prescriben Mestinon para el tratamiento de la miastenia gravis, condición que evita que los mensajes del cerebro lleguen a los músculos. Los músculos se cansan y se debilitan rápidamente y, en casos severos, se pueden paralizar. Mestinon ayuda a que los mensajes lleguen fácilmente.

Mestinon también se prescribe cuando los mensajes del cerebro no llegan a los músculos de los intestinos, lo que provoca una incapacidad para digerir los alimentos y un tipo de constipación (denominada atonía intestinal o constipación atónica) y en los casos en que no se puede orinar después de una cirugía.

¿Cuándo no se debe ingerir Mestinon?

No debe ingerir Mestinon si sabe que es alérgico o hiperreactivo a cualquiera de las sustancias que contiene o a otras medicinas que contengan bromo o bromuro. Mestinon no se debe administrar en conjunto con relajantes musculares despolarizantes tales como suxametonio (drogas que se utilizan en la anestesia para relajar los músculos). No ingiera Mestinon si tiene una obstrucción en los intestinos o tracto urinario. El médico podrá informarle si alguna de estas condiciones es aplicable para usted.

¿En qué casos hay que tener especial cuidado al ingerir Mestinon?

Antes de iniciar el tratamiento, asegúrese que su médico sepa si usted

- sufre de asma
- tiene problemas con los riñones

**FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE**

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO CONTROL NACIONAL
SUBDIRECCION REGISTRO
UNIDAD DE NOTIFICACIONES

31 MAR 2009

Nº Ref: 6255/08
Nº Registro: F-4164/05
Firma Profesional: [Firma]

- sufre diabetes
- tiene pulsaciones bajas
- se ha sometido recientemente a una cirugía estomacal o intestinal
- padece alguna otra enfermedad
- tiene alergias

Probablemente, los niños necesitarán una dosis más baja de Mestinon que los adultos. Si presenta problemas renales, el médico le prescribirá una dosis inferior de Mestinon, o le indicará una ingesta menos frecuente. Siga cuidadosamente las instrucciones de su médico.

Dependiendo de su respuesta individual al Mestinon, usted puede observar que este producto afecta su capacidad para conducir un vehículo u operar maquinarias. Por lo tanto, asegúrese de conocer su reacción al Mestinon antes de conducir un vehículo u operar maquinarias.

¿Se puede ingerir Mestinon durante el embarazo o la lactancia?

Antes de iniciar el tratamiento, es necesario indicar al médico si está embarazada, si piensa que lo está o planea estarlo. El decidirá si debe tomar Mestinon.

No debe ingerir Mestinon durante la lactancia.

¿Qué sustancias pueden interactuar con Mestinon?

Antes de iniciar el tratamiento, asegúrese que su médico sepa si usted está ingiriendo otros medicamentos (incluidos aquellos no prescritos por él). Esto es de suma importancia, dado que el uso simultáneo de más de un medicamento puede reforzar o debilitar el efecto de los medicamentos. Por lo tanto, no deberá ingerir Mestinon con otras medicinas a menos que haya informado a su médico y haya obtenido su autorización. La atropina y las drogas que actúan como relajantes musculares no permiten que el Mestinon haga efecto. El médico podrá proporcionarle mayor información sobre esta materia.

¿Cómo se debe ingerir el Mestinon?

Ingiera siempre Mestinon exactamente como se lo indique el médico., no obstante la dosis usual recomendada es:

- En el tratamiento de la miastenia gravis: 1 – 3 comprimidos de 60 mg 2 a 4 veces al día, en caso de mayor gravedad se puede aumentar la dosis.

Debe tratar de ingerir el Mestinon de manera que pueda trabajar cuando los músculos más lo requieran por ejemplo: cuando se levanta y a la hora de las comidas. Los comprimidos de Mestinon se demoran entre 15 a 30 minutos en comenzar a hacer efecto, por lo tanto es necesario tratar de ingerir la primera dosis del día 15 – 30 minutos antes de levantarse, y las otras dosis alrededor de 15 – 30 minutos antes de las comidas.

Si tiene miastenia gravis, cada dosis de Mestinon hace efecto durante alrededor de 4 horas en el día y durante alrededor de 6 horas en la noche. Los comprimidos se tragan con agua u otra bebida sin alcohol. Si se olvida tomar una dosis, ingiérala lo antes posible y luego continúe con las dosis siguientes de la forma indicada. No cambie por sí solo la dosis prescrita. Si cree que el efecto de la medicina es demasiado débil o fuerte, converse con su médico.

Si usted u otra persona ha ingerido una sobredosis de Mestinon, debe ponerse en contacto con su médico, con un farmacéutico o acudir al hospital más cercano de inmediato.

¿Cuándo y cómo finaliza un tratamiento con Mestinon?

El médico sabe mejor que nadie cuándo debe dejar de ingerir Mestinon. Por lo general, se prescribe durante todo el tiempo que dura la enfermedad. Mestinon no cura pero ayuda a evitar los

síntomas de la enfermedad. Siempre debe informar al médico si desea dejar de ingerir este medicamento.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de Mestionon?

Además de los efectos benéficos de ~~Prolopa~~ **Mestionon**, es posible que se presenten algunos efectos no deseados durante el tratamiento, aunque se utilice según lo indicado. Se pueden presentar síntomas tales como náuseas, vómitos, diarreas, calambres musculares, pulsaciones más lentas y se puede producir más saliva y lágrimas que lo normal. Si experimenta espasmos musculares (calambres), punzadas y debilidad muscular, informe a su médico ya que él podrá cambiar la dosis. Debe contactarse inmediatamente con su médico si aparece sarpullido en la piel. El decidirá si es necesario detener el tratamiento, y es probable que le informe que usted no podrá volver ingerir Mestionon ni otros medicamentos que contengan bromo o bromuro.

Si siente alguna inquietud acerca de estos o cualquier otros efectos inesperados, convérselo con su médico o farmacéutico.

¿Cómo se debe almacenar el Mestionon?

Mantenga siempre este medicamento en su envase original bien cerrado y fuera de la vista y del alcance de los niños.

Conservar a temperatura ambiente a no más de 30 °C y en lugar seco.

No ingiera este medicamento después de la fecha de vencimiento (EXP) impresa en la parte externa del envase.

Mestionon se prescribe para uso personal y bajo ninguna circunstancia debe dársele a otras personas.

Observaciones generales

Para obtener mayor información sobre Mestionon, diríjase a su médico o farmacéutico, quienes tienen informaciones detalladas.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.

**FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE**