

LABORATORIO CHILE S.A.

REF.: MT546643/14

REG. ISP. N° F-2276/14

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE METRONIDAZOL ÓVULOS 500 mg

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

COMPOSICION Y PRESENTACION.

Cada óvulo contiene: Metronidazol..... 500 mg.

Excipientes:

Envase de 10 óvulos

INDICACIONES: Este medicamento está indicado en el tratamiento de vaginitis producidas por tricomonas y vaginitis no especificadas.

CLASIFICACION: Tricomonicida. Amebicida.

ADVERTENCIAS: Use sólo por indicación y bajo supervisión médica. No use por más de 10 días sin control médico.

CONTRAINDICACIONES: No usar en caso de presentar hipersensibilidad al metronidazol, alteraciones en la sangre (discrasia sanguínea). Contraindicado en el primer trimestre del embarazo, alteración hepática severa y del sistema nervioso central (incluyendo epilepsia).

INTERACCIONES: Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes productos: **Alcohol, Cimetidina, Disulfiramo, Barbitúricos, Antiepilépticos, Anticoagulantes.**

EFFECTOS INDESEABLES: El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que requieren atención médica; para el caso de los óvulos, se puede producir cierta irritación vaginal, dolor durante relaciones sexuales, flujo vaginal blanco y espeso, irritación de órganos sexuales, ardor al orinar, picazón del área genital.

REACCIONES ADVERSAS: Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este producto, consulte a su médico: Neuropatía periférica (entumecimiento, hormigueo, dolor o debilidad en manos o pies. Crisis convulsivas. Toxicidad del SNC (torpeza o inestabilidad, cambios en el estado de ánimo o mental). Reacciones de hipersensibilidad (enrojecimiento de la piel, picazón), leucopenia (dolor de garganta, ronquera y fiebre), pancreatitis (dolor intenso en el abdomen y espalda), candidiasis vaginal.

Efectos que no requieren atención médica: náuseas, pérdida de apetito, sequedad bucal, alteraciones del gusto, dolor abdominal leve.

PRECAUCIONES: Administrar con precaución durante el periodo de lactancia, en personas con disfunción hepática.

- Mayores de 60 años


Debe administrarse con precaución en pacientes ancianos, siguiendo las indicaciones de su médico.

- Embarazo

No debe utilizarse durante el primer trimestre del embarazo, en el segundo y tercer trimestre puede utilizarse sólo si no existe una alternativa más segura.

- Lactancia

Este medicamento pasa a la leche materna y puede afectar al lactante. Converse con su



LABORATORIO CHILE S.A.

REF.: MT546643/14

REG. ISP. N° F-2276/14

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
METRONIDAZOL ÓVULOS 500 mg

médico la conveniencia de seguir el tratamiento o dejar de amamantar.

- Lactantes y niños

No existe información sobre la seguridad de utilizar este medicamento en niños, debe seguir las indicaciones de su médico.

- Precauciones especiales

Si usa el medicamento para tratar tricomoniasis, se recomienda que el tratamiento se lleve a cabo por ambos miembros de la pareja, incluso si uno de los dos no presenta síntomas de la enfermedad.

Debe evitar mantener relaciones sexuales durante el tratamiento con este medicamento.

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

Evite el consumo de alcohol mientras esté en tratamiento con este medicamento y por lo menos 1 día después de terminado el tratamiento, ya que se pueden producir mareos, sofocos u otras reacciones serias.

DOSIS: El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

-Tricomoniasis: 1 óvulo (500 mg.) vía vaginal en la noche por un período de 10 días, en combinación con tratamiento por vía oral.

-Vaginitis no especificada: 1 óvulo (500 mg.) vía vaginal en la noche por un periodo de 7 días, en combinación con tratamiento por vía oral si es necesario.

Debe evitar olvidar alguna aplicación y respetar los horarios. Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

MODO DE EMPLEO: Lave sus manos antes y después de utilizar esta medicina.

Se recomienda aplicar el medicamento y luego mantenerse un par de minutos recostada para evitar que el medicamento se derrame. Es aconsejable que utilice ropa interior de algodón y cambiarla a diario.

SOBREDOSIS. En caso de aparición de síntomas, trasladar al paciente a un centro asistencial de urgencia, para un tratamiento sintomático y de mantención. Llevar este folleto de información.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener lejos del alcance de los niños; en su envase original; protegido del calor, la luz y la humedad. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase. Almacenar a temperatura menor a 30°C.

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACION MEDICA.
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.