



MINTLAB

## Geniol Flu Día-Noche Pseudoefedrina 60 mg 20 Comprimidos



### GENIOL FLU DN Comprimidos Recubiertos

Laboratorio: MINTLAB

#### **Drogas:**

- Clorfenamina
- Paracetamol
- Pseudoefedrina Sulfato

#### **Acciones:**

- Aparato Respiratorio: Antialérgicos Antihistamínicos
- Sistema Nervioso Central: Analgésicos Antitérmicos

#### **Acciones:**

- **Comprimidos Día:** Cada comprimido recubierto (amarillo) contiene: Paracetamol 500 mg; Pseudoefedrina Sulfato 60 mg. Excipientes: Polividona, Lauril Sulfato de Sodio, Croscarmelosa Sódica, Estearato de Magnesio, Celulosa Microcristalina, Alcohol Polivinílico, Dióxido de Titanio, Polietilenglicol, Talco, Colorante FD&C Amarillo N° 5 - Laca. **Comprimidos Noche:** Cada comprimido recubierto (azul) contiene: Paracetamol 500 mg; Pseudoefedrina Sulfato 60 mg; Clorfenamina Maleato 4 mg. Excipientes: Polividona, Lauril Sulfato de Sodio, Croscarmelosa Sódica, Estearato de Magnesio,



- Celulosa Microcristalina, Alcohol Polivinílico, Dióxido de Titanio, Polietilenglicol, Talco, Colorante FD&C Rojo N° 40 - Laca, Colorante FD&C Azul N° 2 - Laca.
- Paracetamol es un analgésico antipirético, pseudoefedrina sulfato es un descongestionante y clorfenamina maleato es un antihistamínico.
- Tratamiento sintomático de los estados gripales y resfrío común, indicado en aquellos pacientes que presentan somnolencia con el uso de antihistamínicos durante el día.
- **Forma de administración:** Vía oral. **Dosis:** El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada en adultos es de 1 comprimido Día (amarillo) 3 veces al día y 1 comprimido Noche (azul) al acostarse. Este producto contiene paracetamol, no administrar más de 4 g diarios de paracetamol.
- Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. **Consulte inmediatamente al médico si alguno de estos síntomas ocurre:** mareos, hipotensión, hipertensión, taquicardia, rash cutáneo, urticaria, dermatitis, reacciones de hipersensibilidad, insomnio, mareos, vértigo, nerviosismo. **Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo:** sequedad de la boca o nasal, náuseas, constipación, vómitos, diarrea, fotosensibilidad, somnolencia, cansancio.
- **Si su médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos:** Pacientes con hipersensibilidad a paracetamol, pseudoefedrina sulfato o clorfenamina maleato o a cualquier componente de la formulación. Pacientes con hipertensión severa, enfermedad hepática severa, cardiopatía isquémica. Embarazo y lactancia.
- Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. Usar con precaución en pacientes con glaucoma, hipertensión, diabetes mellitus, hipertiroidismo, enfermedad hepática o renal, hipertrofia prostática. Geniol Flu DN debe ser usado con precaución en pacientes de edad avanzada por los posibles efectos adversos. No administrar a niños menores de 12 años, sin consultar al médico. Se debe advertir a los pacientes que con los comprimidos recubiertos Noche (azules) se puede afectar su capacidad para ejecutar actividades que requieran de alerta mental o coordinación física. **Este producto contiene paracetamol:** No administrar por más de 5 días en caso de dolor, por más de 3 días en caso de fiebre, o por más de 2 días en caso de dolor de garganta sin consultar al médico. El uso prolongado y de altas dosis de paracetamol puede provocar severo daño hepático.
- **El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Ud. debe comunicar a su médico o farmacéutico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta médica, antes de usar este fármaco, especialmente si se trata de:** hipotensivos, depresores del sistema nervioso central, inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAO), anticoagulantes, anticonvulsivantes, isoniazida, glucósidos cardíacos, hormona tiroidea. Ud. no debe ingerir alcohol mientras toma este medicamento. No olvide mencionar que Ud. está tomando este medicamento, en caso de requerir atención médica por otras razones, o en caso que se someta a algún examen.
- Conduzca al intoxicado a un centro de atención médico.



- **Condiciones de almacenamiento:** Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, la luz y la humedad, a no más de 25 °C. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.