

Vermoil Albendazol 200 mg – Caja x 2 Comprimidos





¿Para qué enfermedades o condiciones se prescribe este medicamento?

Está indicado en el tratamiento de parasitosis intestinales únicas y múltiples de *Ascaris lumbricoides* (ascariasis), *Trichuris trichiura* (tricocefalosis), *Enterobius vermicularis* (enterobiasis), *Ancylostoma duodenale* y *Necator americanus* (uncinariasis), *Taenia solium* y *Taenia saginata* (teniasis), *Strongyloides stercoralis* (estrongiloidosis), *Hymenolepis nana*, *Opisthorchis viverrini*, *Opisthorchis sinensis* y *Giardia lamblia* en niños.

¿Qué precauciones debo tener al usar este medicamento?

Si los pacientes no curan después de 3 semanas, se debe efectuar un segundo tratamiento. Para lograr una cura completa en el caso de la infestación por *E. vermicularis*, prescriba estrictas medidas de higiene y trate también a los familiares e individuos que comparten la misma vivienda. En caso de infección por *Hymenolepis nana* probada, se recomienda un retratamiento de 10-21 días. Los comprimidos pueden ser masticados, tragados o quebrados y mezclados. No son necesarios procedimientos especiales como ayuno o uso de laxantes. Algunas personas, especialmente los niños pequeños, podrían experimentar dificultades para deglutir los comprimidos enteros, por lo cual se les deberá alentar a que los mastiquen con un poco de agua; alternativamente, los comprimidos se pueden también triturar.

Contraindicaciones:

Precaución en pacientes con alergia a parabenos.

Efectos Adversos:

Se han asociado problemas digestivos y cefaleas.