



# LABORATORIO BENGUEREL LTDA.

## FOLLETO PARA INFORMACION MEDICA

### C E F A D R O X I L O

#### DESCRIPCION :

Cefadroxilo es una cefalosporina semisintética, activa por vía oral y cuya acción bactericida es ejercida sobre un amplio espectro de gérmenes gram positivos y gram negativos. In vitro la actividad de Cefadroxilo ha sido demostrada para el estreptococo beta-hemolítico, estreptococo pneumoniae, hemophilus influenzae, proteus mirabilis y neisseria gonorrhoeae.

Es altamente resistente a las bacterias productoras de penicilinas.

Cefadroxilo es químicamente estable, resistente al medio ácido y bien absorbido después de su administración oral, aún cuando se administre con las comidas. Comparado con otras cefalosporinas de uso oral, tiene un perfil farmacocinético único: se absorbe lentamente desde el tracto gastrointestinal y tiene una vida media que dobla la de cualquiera de las otras drogas. Su tasa de eliminación, en comparación a otras cefalosporinas orales, es lenta, por lo cual permanece en el organismo por periodos más prolongados, alcanzando una distribución rápida.



Cefadroxilo puede ser detectado en la sangre a las 12 horas después de una sola administración.

Cefadroxilo no se metaboliza in vivo. Aproximadamente el 90% de la droga se excreta inalterada por la orina en un periodo de 24 horas.

Se une a proteínas plasmáticas en un 15%.

#### INDICACIONES :

Cefadroxilo está indicado en el tratamiento de infecciones urinarias, ginecológicas y respiratorias, causadas por microorganismos gram positivos y gram negativos sensibles.





## LABORATORIO BENGUEREL LTDA.

### CONTRAINDICACIONES Y ADVERTENCIAS :

Cefadroxilo está contraindicado en pacientes alérgicos e hipersensibles a los antibióticos betalactámicos (penicilinas y cefalosporinas).

No debe usarse en infecciones meningéas, ya que atraviesa la barrera hematoencefálica.

En pacientes con insuficiencia renal las dosis deberán ser reducidas.

Dado que la experiencia con neonatos e infantes es limitada, Cefadroxilo debe emplearse con precaución y bajo vigilancia médica.

### REACCIONES ADVERSAS :

Igual que otras cefalosporinas orales Cefadroxilo puede producir potencialmente reacciones alérgicas, ocasionalmente erupciones cutáneas, prurito y angioedema, malestar estomacal, diarrea, vómitos y dispepsia.

### POSOLOGIA :

La dosis diaria recomendada para niños de menos de 40 kilos es de 30 mg/Kg/día, administradas en dosis parciales cada 8 a 12 horas.

La dosis usual es de una cucharadita (5 ml) cada 8 horas, ó 2 cucharaditas (10 ml) cada 12 horas, según la gravedad y tipo de infección.

### PRESENTACION :

Frasco con polvo para preparar 60 ml de suspensión.

Elaborado en Chile para  
Laboratorio Benguerel Ltda.  
por Laboratorios Andrómaco Ltda.  
Av. Vicuña Mackenna 3451 - Santiago.