



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE GEMFIBROZIL COMPRIMIDOS 300 mg



Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su Médico.

Composición:

Cada comprimido contiene:
Gemfibrozilo 300 mg
Excipientes: Almidón Pregelatinizado, Almidón Glicolato de Sodio, Polividona K-30, Lauril Sulfato de Sodio, Ácido Esteárico, Almidón de Maíz.

Clasificación:

Hipolipemiante

Indicación:

Complemento de la dieta y del manejo no farmacológico (como ejercicio, pérdida de peso en los siguientes casos:

- Tratamiento de hipertrigliceridemia grave con o sin colesterol HDL bajo.
- Hiperlipidemia mixta cuando las estatinas estén contraindicadas o no sean toleradas por el paciente.

Advertencias y Precauciones:

- Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.
- Antes de iniciar la terapia se debe hacer un enérgico intento de controlar los triglicéridos y colesterol séricos por medio de dieta, reducción de peso, ejercicio, restricción de alcohol y controlar otra enfermedad subyacente que pueda causar una alteración de los Lípidos.
- No se ha establecido la seguridad y eficacia de este medicamento en menores de 18 años.
- Este medicamento contiene Lactosa, precaución en pacientes intolerantes a la lactosa.

Contraindicaciones:

Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

- Embarazo, lactancia.
- Pacientes con enfermedad de vesícula, renal o hepática.
- Alergia a Gemfibrozilo o a alguno de los componentes de la formulación.
- Pacientes con hiperlipidemia tipo I.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Ud. debe comunicar a su Médico o Farmacéutico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta médica, antes de usar este fármaco. Especialmente: anticoagulantes orales, Lovastatina, diuréticos, estrógenos, Metildopa, Colestipol, Colestiramina.

Efectos Adversos (no deseados):

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al Médico si alguno de estos síntomas ocurre: dolor de cabeza, mareos, somnolencia, visión borrosa, rash, prurito, dolor muscular. Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo: dolor abdominal, diarrea, náuseas, vómitos, constipación, reacciones alérgicas cutáneas.

Formas de administración:

Vía oral.

Dosis:

El Médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada en adultos es de 600 mg 2 veces al día, preferentemente 30 minutos antes del desayuno y de la cena.

Sobredosis:

En caso de sobredosis, conduzca inmediatamente al intoxicado a un Centro de Atención Médico.

Condiciones de Almacenamiento:

Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25 °C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA

V2
732398
27.09.18