

Pentinor Pregabalina 75 mg 40 Cápsulas



Pentinor Pregabalina 75 mg 40 Cápsulas

Indicaciones: Dolor neuropático: Indicado en el tratamiento del dolor neuropático en adultos. Epilepsia: Indicado como coadyuvante en el tratamiento de las crisis parciales con o sin generalización secundaria en pacientes a partir de los 12 años de edad.

Beneficios

Trastorno de ansiedad generalizada: Indicado en el tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada (TAG) en adultos. Fibromialgia: Pregabalina está indicada para el manejo del síndrome de fibromialgia en adultos.

Principales principios activos

- Pregabalina 75 mg.

Modo de uso

El rango de dosis es de 150 a 600 mg al día, dividiendo su administración en 2 ó 3 tomas. Dolor neuropático: El tratamiento con pregabalina se puede comenzar con una dosis de 150 mg al día, que se puede administrar dividida en 2 ó 3 tomas. En función de la respuesta y tolerabilidad individual de cada paciente, la dosis se puede incrementar hasta 300 mg al día después de un intervalo de 3 a 7 días, y si fuese necesario, hasta una dosis máxima de 600 mg al día después de un intervalo adicional de 7 días. Epilepsia: El tratamiento con Pregabalina se puede iniciar con una dosis de 150 mg al día, que se puede administrar dividida en 2 ó 3 tomas. En función de la respuesta y tolerabilidad individual de cada paciente, la dosis se puede incrementar a 300 mg al día después de 1 semana. La dosis máxima que se puede alcanzar, después de 1 semana adicional, es de 600 mg al día. Trastorno de ansiedad generalizada: El rango de dosis es de 150 a



600 mg al día, dividiendo su administración en 2 ó 3 tomas. Se debe reevaluar de forma periódica la necesidad del tratamiento. El tratamiento con Pregabalina se puede iniciar con una dosis de 150 mg al día. En función de la respuesta y tolerabilidad individual de cada paciente, la dosis se puede incrementar a 300 mg al día después de 1 semana. Tras 1 semana adicional, la dosis se puede incrementar a 450 mg al día. La dosis máxima que se puede alcanzar, después de 1 semana adicional, es de 600 mg al día. Síndrome de fibromialgia: Las dosis terapéuticas van desde 300 a 450 mg diarios, comenzando con una dosis de 75 mg 2 veces al día y aumentando gradualmente de acuerdo a la respuesta y tolerabilidad del paciente.

¿Qué efectos secundarios tiene la Pregabalina?

Pregabalina puede producir mareos, somnolencia y disminución de la concentración. No debe conducir, manejar maquinaria pesada ni practicar otras actividades potencialmente peligrosas hasta que sepa si este medicamento afecta a su capacidad para realizar estas actividades.

¿Cuánto tiempo se debe tomar la Pregabalina?

En función de la respuesta y tolerabilidad individual de cada paciente, la dosis se puede incrementar hasta 300 mg al día después de un intervalo de 3 a 7 días, y si fuese necesario, hasta una dosis máxima de 600 mg al día después de un intervalo adicional de 7 días.