

**FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE****ELCAL FORTE CÁPSULAS 450 mg**

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

CONDICIÓN DE VENTA: Venta Directa en Establecimientos de tipo A y B.

CLASIFICACIÓN: suplemento ~~de la dieta~~ de minerales.

COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN:

Cada cápsula contiene:

Carbonato de calcio 1.125,00 mg

(Equivalente a 450 mg de calcio iónico)

Excipientes: polividona, laurilsulfato de sodio, dióxido de silicio coloidal, almidón glicolato sódico, colorante FD&C azul N°1, colorante FD&C rojo N°40, dióxido de titanio, colorante FD&C amarillo N°5, óxido de hierro negro, c.s.

1.- ¿Para qué se usa?

~~Este medicamento está indicado en estados carenciales o de mayores requerimientos de calcio en niños y adolescentes, embarazo y lactancia. Coadyuvante en la prevención de la osteoporosis, fracturas en ancianos, desmineralización postmenopáusica, cuadros de disminución del rendimiento neuromuscular y calambres musculares.~~



Este medicamento esta indicado como Suplemento de Calcio en estados carenciales.

2.- Administración (oral)**Dosis:**

Dosis usual en adultos: 1 a 2 cápsulas al día.

~~**Range y frecuencia**~~

- ~~• Estos son los requerimientos diarios de calcio:~~
- ~~• De 0 a 6 meses: 210 mg.~~
- ~~• De 6 meses a 1 año: 270 mg.~~
- ~~• De 1 a 3 años: 500 mg.~~
- ~~• De 4 a 8 años: 800 mg.~~
- ~~• De 9 a 18 años: 1300 mg.~~
- ~~• De 19 a 50 años: 1000 mg.~~
- ~~• Sobre 51 años: 1200mg.~~
- ~~• Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 1000 mg.~~



**FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE****ELCAL FORTE CÁPSULAS 450 mg****- Consejo de cómo administrarlo**

No debe tomar el calcio en forma conjunta con otros medicamentos (especialmente: Tetraciclina, fluoruros, cimetidina, ranitidina, famotidina). Debe tomarlo 1 a 2 horas después de haber ingerido el otro medicamento.

La mayoría de los suplementos de calcio deben ser tomados con las comidas.

Se recomienda que tome el medicamento con un vaso lleno de agua o jugo.

- Uso prolongado

A pesar de que el calcio es necesario para el organismo un consumo excesivo o por un periodo prolongado de este medicamento sin control periódico de su médico, puede conducir a efectos dañinos severos sobre su salud.

3.- Precauciones y advertencias

No administrar a niños menores de 12 años, sin prescripción médica.

No exceda la dosis recomendada, salvo expresa indicación médica.

Evite el uso concomitante de otros suplementos de vitaminas y minerales.

- Consumo de alcohol

No consuma grandes cantidades de alcohol, café y tabaco, durante el tratamiento con Calcio, ya que estos pueden disminuir la absorción del medicamento.

- Embarazo

Es muy importante que ingiera calcio durante el embarazo, pero un exceso de este Suplemento puede ser dañino para la madre y / o el feto. El uso de este medicamento durante el embarazo debe ser bajo prescripción médica.

- Lactancia

Es muy importante que ingiera calcio durante el periodo de lactancia, pero un exceso de este suplemento puede ser dañino para la madre y / o el lactante. El uso de este medicamento durante la lactancia debe ser bajo prescripción médica.

- Precauciones especiales

Recuerde que la cantidad total de calcio que usted consume cada día incluye la de los alimentos, además del proveniente de este suplemento.

No ingiera otros medicamentos o suplementos que contengan grandes cantidades de calcio, fosfato o vitamina D, a menos que su médico lo indique.

No, tome este medicamento antes de que hayan transcurrido 1 a 2 horas a partir de la ingestión de otros medicamentos o de un alimento con un alto contenido en fibra (por Ej., cereales de afrecho o productos con harina integral).

Se debe tener precaución en aquellas personas con los siguientes patologías: enfermedad renal, deshidratación severa, diarrea crónica, síndrome de mala absorción, niveles altos de calcio en la sangre y en la orina.

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia al carbonato de calcio.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación

**FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE**

**FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE****ELCAL FORTE CÁPSULAS 450 mg****5.- Interacciones****- Medicamentos**

Usted debe consultar con el farmacéutico la conveniencia de usar este medicamento, si está tomando otros, particularmente ácido alendrónico, fenitoína, sales de hierro, sales de zinc, hidroclorotiazida, digoxina, tetraciclina, vitamina D, otros medicamentos que contengan calcio y / o vitamina D, anticonceptivos, antiácidos que contengan magnesio.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa. En el caso particular de este medicamento, si padece de diarrea, problemas intestinales, híper o hipoparatiroidismo, sarcoidosis, alguna enfermedad a los huesos, cálculos renales, hipercalcemia (mucho calcio en la sangre) o hipercalcuria (mucho calcio en la orina).

- Alimentos

Debe evitar consumir cafeína en grandes cantidades, durante el tratamiento con este medicamento.

- Exámenes de laboratorio

Si se va a someter a algún examen médico, avísele a su médico a cargo que usted se encuentra en tratamiento con este medicamento.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: mareos, sensación de calor, arritmias, náuseas, vómitos, sudoración, debilidad, constipación severa, sed, gusto metálico, boca seca, irritabilidad, pérdida del apetito, ritmo cardíaco irregular, dificultad par orinar.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: estreñimiento, gases.

7.- Sobredosis

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: mareos, sensación de calor, arritmias, náuseas, vómitos, sudoración.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, luz y humedad.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico
No recomiende este medicamento a otra persona.

**FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE**