

URICONT

Oxibutinina es un sólo fármaco con 2 acciones distintas: sobre músculo liso, ejerce un efecto antiespasmódico e inhibe la acción muscarínica de la acetilcolina.

Estudios cistométricos han demostrado que el efecto neto del fármaco en pacientes con vejiga neurogénica, no inhibida. Vejiga neurogénica refleja son:

- Aumento de la capacidad de la vejiga
- Disminución de la frecuencia de las contracciones de la vejiga no inhibida.
- Demora el deseo inicial del vaciamiento vesical.

Indicaciones y usos clínicos:

Oxibutinina está indicado para el alivio de los síntomas asociados con la incontinencia urinaria en pacientes con vejiga neurogénica refleja, estas son las enuresis nocturna, traspasos miccionales, nicturia, urgencia miccional, rictus miccional, etc.

Contraindicaciones:

Oxibutinina está contraindicado en pacientes con glaucoma, en obstrucción parcial o completa del tracto gastrointestinal, ileo paralítico, atonía intestinal en pacientes debilitados, megacolon, colitis ulcerativas, miastenia grave y uropatía obstructiva.

Advertencia:

Si se administra en presencia de fiebre puede causar aumento de la temperatura porque produce disminución de la sudoración.

21 SEP 1993

Precauciones:

Si el paciente presenta somnolencia o visión borrosa, no deberá conducir vehículo ni manejar maquinarias o participar en actividades que requieren concentración.

Efectos secundarios:

Se ha reportado de la boca, disminución de la sudoración, retención urinaria, visión borrosa, taquicardia, palpitaciones, dilatación de la pupila, cicloplejía, aumento de la presión ocular, somnolencia, debilidad, insomnio, náuseas, vómitos, constipación, impotencia, supresión de la lactancia, reacciones alérgicas severas o reacciones de idiosincrasia con urticaria y otras manifestaciones dermatológicas.

Vía de administración:

Posología:

Adultos:

La dosis usual son 2 a 3 comprimidos al día. La dosis máxima recomendada es de 4 comp. al día.

Niños mayores de 5 años:

La dosis usual son 2 comprimidos al día. La dosis máxima recomendada son 3 comprimidos al día.

Presentación:

Envase público: Envase de 20, 30, 40, 50 y 100 comprimidos.

21 SEP 1993