

FICHA PRODUCTO

Descripción Producto

Registro	: F-6546/20
Nombre	: ESPIRONOLACTONA COMPRIMIDOS 25 mg
Referencia de Trámite	:
Equivalencia Terapéutica o Biosimilar	: EQUIVALENTE TERAPÉUTICO
Titular	: LABORATORIOS ANDRÓMACO S.A.
Estado del Registro	: Vigente
Resolución Inscribase	: 556
Fecha Inscribase	: 22/01/1985
Última Renovación	: 22/01/2020
Fecha Próxima renovación	: 22/01/2025
Régimen	: Fabricación Nacional
Vía Administración	: ORAL
Condición de Venta	: Receta Médica
Expende tipo establecimiento	: Venta A Establecimiento A Y Asistencial
Indicación	:

Envases

Tipo Envase	Descripción Envase	Periodo Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Envase Clínico	Blister pack de PVC transparente / aluminio termosellable impreso	12 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	100, 500 y 1000	COMPRIMIDOS
Venta Público	Blister pack de PVC transparente / aluminio termosellable impreso	12 Meses	Almacenado A No Más De 25°C	10 y 20	COMPRIMIDOS
Venta Público	Blister pack PCTFE (Aclar)-PVC ámbar con aluminio termosellable impreso.	36 Meses	Almacenado A No Más De 30°C	10 a 60	COMPRIMIDOS
Envase Clínico	Blister pack PCTFE (Aclar)-PVC ámbar con aluminio termosellable impreso.	36 Meses	Almacenado A No Más De 30°C	50 a 2000	COMPRIMIDOS
Muestra Médica	Blister pack PCTFE (Aclar)-PVC ámbar con aluminio termosellable impreso.	36 Meses	Almacenado A No Más De 30°C	1 a 60	COMPRIMIDOS

Función Empresa

Función Empresa	Razón Social	País
FABRICACIÓN NACIONAL TERMINADO	LABORATORIOS ANDROMACO S.A.	Chile
FABRICANTE DE PRINCIPIOS ACTIVOS	ZHEJIANG XINHUA	CHINA

Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
ESPIRONOLACTONA	25,00	mg	

 [Volver a tabla de registros encontrados](#)

Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000
Ñuñoa, Santiago
Casilla 48 Correo 21
Código Postal 7780050

Mesa Central
(56-2) 5755 101
Informaciones
(56-2) 5755 201

Contacto con OIRS

Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias

ANDROMACO

Espironolactona 25 mg 20 Comprimidos



¿Para qué enfermedades o condiciones se prescribe este medicamento?

Tratamiento de edema asociado a cirrosis hepática, síndrome nefrótico e insuficiencia cardíaca congestiva e hiperaldosteronismo secundario. Tratamiento coadyuvante en la hipertensión. Diagnóstico y tratamiento del hiperaldosteronismo primario.

¿Qué precauciones debo tener al usar este medicamento?

Advertencias y precauciones: Antes de usar este medicamento deben sopesarse los riesgos y los beneficios en su uso, los que deben ser discutidos entre Ud. y su médico. Principalmente debe considerar los aspectos siguientes: Alergias: Ud. debe comunicar a su médico si alguna vez ha presentado alguna reacción alérgica a este medicamento o a alguna otra sustancia, ya sea alimentos, preservantes, colorantes, saborizantes u otros medicamentos. Embarazo: Ud. debe comunicar a su médico si está embarazada o planea estarlo. Lactancia: Este medicamento pasa a la leche materna, informe a su médico si Ud. está amamantando. Niños: Este medicamento se ha usado en niños, sin observarse efectos o problemas diferentes a los observados en adultos.

Ancianos: Signos y síntomas de exceso de potasio son más evidentes en ancianos, debido a que son más sensibles a los efectos de este medicamento.