



# FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

## CLOBETASOL PROPIONATO

### CREMA TÓPICA 0,05%



Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su uso. Lea este folleto cada vez que reciba una nueva orden de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

#### Composición:

Cada 100 g de crema contiene:  
Clobetasol Propionato 0,05 g  
Excipientes: Alcohol Cetosteárilico, Petrolato Blanco, Vaselina Líquida, Polioxil 20 Cetosteárilico, Propilenglicol, Propilparabeno, Metilparabeno, Agua Purificada.

#### Clasificación:

Glucocorticoide.

#### Indicación:

Tratamiento a corto plazo de manifestaciones inflamatorias y pruríticas de dermatosis que no respondan a corticoides menos activos.

#### Advertencias y Precauciones:

- Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica
- No aplicar en los ojos
- Administrar con precaución en pacientes ancianos, ya que son más susceptibles de sufrir efectos adversos.

#### Contraindicaciones:

- Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos:
- Pacientes con hipersensibilidad a Clobetasol Propionato, otro corticoide o a alguno de los componentes de la crema.
- Su uso en dermatosis no está indicado en niños menores de 1 año, incluso no debe ser usado en dermatitis y erupciones del pañal.

#### Uso en Embarazo y Lactancia:

Se recomienda su uso sólo si el potencial beneficio/riesgo para el feto se justifica, teniendo la precaución de no usar en áreas muy extensas ni por períodos prolongados de tiempo.

#### Interacciones:

No se han descrito interacciones importantes con Clobetasol Propionato crema.

#### Presencia de otras Enfermedades:

El efecto de un medicamento puede modificarse por la presencia de una enfermedad, dando lugar a efectos no deseados, algunos de ellos severos. En caso de sufrir alguna enfermedad Ud. debe consultar al Médico o Farmacéutico antes de aplicar este medicamento, especialmente en los casos siguientes: glaucoma, cataratas, diabetes mellitus, tuberculosis.

#### Efectos Adversos (no deseados):

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al Médico si alguno de estos síntomas ocurre: aumento de la sensibilidad dérmica, piel oscura, dolor en la piel, inflamación, adelgazamiento de la piel en forma dolorosa y lenta.

Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo: sensación de ardor, inflamación, enrojecimiento de la piel, rash cutáneo, sequedad de la piel.

#### Forma de Administración:

Vía tópica.

#### Dosis:

El Médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada en adultos es la aplicación de la crema sobre el área afectada 1 ó 2 veces al día.

#### Sobredosis:

En caso de sobredosis, conduzca inmediatamente al intoxicado a un Centro de Atención Médica.

#### Condiciones de Almacenamiento:

Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25 °C.  
No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO  
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA

V6  
730912  
27.01.15

Versión : 6 Fecha Creación: 27.01.15

Cód. Insuño (SGA): 730912

Descriptor Insuño: Foll. Clobetasol Propionato

Medidas (mm) : 100 x 120 mm.

Escala : 1:1

Tacas: 062

Control de Cambios ☐ SI ☐ No

☐ Sanitario ☐ Diseño ☐ Fabril ☐ Otro

Especificar:

#### Vºº Comercial

Nombre:

Fecha:

Firma:

Observaciones

#### Vºº Dirección Técnica

Nombre:

Fecha:

Firma:

Pantone:

