

Flucloxacilina 500 mg 12 Capsulas





Flucloxacilina se utiliza para tratar infecciones provocadas por bacterias sensibles a este antibiótico, tales como ciertas infecciones de la piel, articulaciones y huesos y en infecciones respiratorias.

Sí, el uso de antibióticos requiere diagnóstico e indicación médica. La dosis también debe ser indicada por el médico, dependiendo de la edad del paciente y su condición médica.

• Informar al médico si ha presentado reacciones alérgicas a la penicilina o a otros medicamentos. En personas sensibles, la amoxicilina puede causar reacciones de hipersensibilidad, en algunos casos grave. Solicite asistencia médica inmediata si presenta sarpullido severo, prurito (picazón), urticaria, dificultad para respirar o tragar. • Utilizar este medicamento en las dosis y horarios indicados por el médico. Para que el medicamento sea efectivo, es muy importante que cumpla estrictamente el horario de administración. • Realizar el tratamiento por el período indicado y no suspenderlo antes de tiempo aunque los síntomas hayan desaparecido. Si lo hace, la infección podría complicarse debido a la aparición de bacterias resistentes. • Como todos los medicamentos, flucloxacilina puede causar efectos no deseados en algunos pacientes; los más frecuentes son diarrea, náuseas, vómitos. Si estas molestias son muy intensas o no desaparecen, consulte a su médico.