


29 JUN 2004

**Pitil MR**  
**Baclofeno**



Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento, contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.

### **Composición y Presentación:**

Cada comprimido contiene:

Baclofeno 10 mg

Excipientes: polividona, celulosa microcristalina pH 101, crospovidona, dióxido de silicio coloidal, estearato de magnesio, almidón de maíz.

### **Clasificación:**

Relajante muscular, antiespástico. El Baclofeno es capaz de inhibir los reflejos monosinápticos y polisinápticos en el nivel espinal.

### **Recomendaciones de Uso:**

En la reducción de los signos y síntomas de espasticidad de la musculatura estriada, resultantes de la esclerosis múltiple.

### **Advertencias y Precaucione:**

Si experimenta algún tipo de reacción alérgica deje de tomar este medicamento y avise a su médico o farmacéutico inmediatamente.

Debe evitarse el retiro brusco de la droga, excepto en el caso de reacciones adversas severas. No debiera usarse durante el embarazo, a menos que los riesgos potenciales para el feto se justifiquen por el beneficio materno. La posibilidad de sedación producida hace preciso advertir a los pacientes del riesgo de operar máquinas peligrosas o manejar automóviles. En epilepsia, desórdenes psicóticos, esquizofrenia o estados confusionales es posible observar exacerbaciones, por lo que debe hacerse un seguimiento cercano de estos pacientes. El Baclofeno debe administrarse con precaución a pacientes con antecedentes de disreflexia autonómica. Administrado por vía oral pasa a la leche materna. Los pacientes deben estar libres de infecciones antes de evaluar la respuesta al Baclofeno.

FOLLETO DE INFORMACION  
AL PACIENTE

### **Efectos adversos (no deseados):**

Se han observado efectos adversos como: somnolencia, mareos, debilidad, fatiga. Con poca frecuencia: confusión, cefaleas, insomnio, alucinaciones, parestesia, depresión, euforia, miosis, midriasis, diplopía, hipotensión, náuseas, constipación, disuria, impotencia, prurito, congestión nasal

### **Forma de Administración:**

El tratamiento se iniciará siempre con dosis bajas de Baclofeno que se incrementarán gradualmente. La dosis diaria óptima se adaptará individualmente a las necesidades del paciente, de tal modo que se aminoren el clonus, los espasmos de flexores y extensores y la espasticidad, pero evitando en lo posible los efectos secundarios.

Para evitar una debilidad excesiva y las caídas, Baclofeno se empleará con precaución cuando la espasticidad sea necesaria para mantener la postura erguida y

el equilibrio en la locomoción o cuando la espasticidad se utilice para mantener la función. Puede ser importante mantener cierto grado de tonicidad muscular y permitir que se produzcan espasmos ocasionales para contribuir a apoyar la función circulatoria. Baclofeno se ingerirá durante las comidas con un poco de líquido. La dosis diaria se fraccionará preferentemente en 3 tomas para los adultos y en 4 para los niños.

**Dosis**

La que su médico le indique.

**Condiciones de Almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, luz y humedad. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.

No recomiende este medicamento a otra persona.

**Presentación:**

Cajas con X X X comprimidos.

FOLLETO DE INFORMACION  
AL PACIENTE