

ARTWORK INFOLEAFLET

90 x 114 mm

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

CLORANFENICOL UNGÜENTO OFTÁLMICO 1 %

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN:

Principio Activo: Cloranfenicol 1 g/100 g
Excipientes: Parafina blanca suave, Parafina sólida, Parafina líquida.

Envase con 1 tubos de 3,5 ó 5 g.

CLASIFICACION:

Antibacteriano (oftálmico).

INDICACIONES:

Tratamiento de infecciones oculares.
Está indicado en el tratamiento tópico de las infecciones superficiales que afectan a la conjuntiva y/o córnea, producidas por organismos sensibles, incluyendo: escherichia coli, hemophilus influenzae, especies de neisseria, staphylococcus aureus, estreptococos, incluyendo streptococcus hemolyticus y s.pneumoniae, moraxella lacunata (bacilo de Morax- Axenfeld), rickettsias, micoplasmas (PPLO).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Tópica ocular.

DOSIS USUAL PARA ADULTOS Y DOSIS PEDIÁTRICAS:

Tópica, en la conjuntiva, una tira delgada (aproximadamente 1 cm) de ungüento cada tres horas o más frecuentemente.
Por la noche, el ungüento oftálmico puede emplearse como coadyuvante de la solución oftálmica para proporcionar un contacto prolongado con el medicamento. La terapia debe continuarse por 48 horas después de obtener una curación aparente.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad al principio activo.

PRECAUCIONES:

Reproducción/Embarazo:

No se han descrito problemas en humanos.

Lactancia:

No se han descrito problemas en humanos.

Como con otros antibióticos el uso prolongado o inadecuado puede dar como resultado

una sobreinfección de organismos no susceptibles, especialmente hongos. Los ungüentos oftálmicos pueden retardar la curación de la córnea. Existe la posibilidad de que ocurra una discrasia sanguínea por administración prolongada.

ADVERTENCIAS:

Ocasionalmente se ha observado toxicidad hematopoyética con el uso sistémico del Cloranfenicol y raramente con la administración tópica.
Emplear una técnica de administración adecuada para ungüento oftálmico. Cumplir el ciclo completo del tratamiento.

Dosis omitida:

Aplicarla lo antes posible; no hacerlo si casi es la hora de la siguiente dosis. Consultar con el médico si no hay mejora en unos días.

REACCIONES ADVERSAS:

Requieren Atención Médica:

Incidencia rara:

Piel pálida o Dolor de garganta y fiebre o Hemorragia o hematomas no habituales, o Cansancio o debilidad no habituales (discrasias sanguíneas).

Requieren Atención Médica solamente si persisten o son molestos:

Incidencia menos frecuente:

Escorzor o picor.

No requieren Atención Médica:

Visión borrosa.

Indican posible depresión de la médula ósea irreversible posiblemente dando lugar a anemia aplásica y requieren atención médica si aparecen después de interrumpir el medicamento:

Piel Pálida o Dolor de garganta y fiebre o Hemorragias o hematomas no habituales, o Cansancio o debilidad no habituales.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 25°C.
Los medicamentos no se deben eliminar por los desagües ni a la basura. Pregunte a su farmacéutico cómo deshacerse de los envases y de los medicamentos que no necesita. De esta forma ayudará a proteger el medio ambiente.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.

No recomiende este medicamento a otra persona.



bph2015-01

90 mm