

### Tratamiento en niños de 1 a 13 años

Peso Paciente	Dosis recomendada	Duración tratamiento
< 15 kilos	30 mg (2,5 ml) cada 12 hrs	5 días
15-23 kilos	45 mg (3,8 ml) cada 12 hrs	5 días
24-40 kilos	60 mg (5ml) cada 12 hrs	5 días
> 40 kilos	75 mg (1 cap) cada 12 hrs	5 días

\* Dosificación en menores de 15 kg debe ajustarse la dosis

### Profilaxis en niños mayores de 13 años y adultos

Edad	Dosis recomendada	Duración tratamiento
13 años o más	75 mg (1 cap) cada 24 hrs	10 días

Inicio de tratamiento dentro de los 2 primeros días desde que se produce contacto con un individuo afectado.

Fuente: Sección 4.2 Guía para el diagnóstico y manejo clínico de casos de influenza 2012.

### Tratamiento en niños mayores de 13 años y adultos

Edad	Dosis recomendada	Duración tratamiento
13 años o más	75 mg (1 cap) cada 12 hrs	5 días

\* Requiere ajustar las dosis en pacientes con insuficiencia renal y en pacientes en hemodíalisis



**RIMIVAT® CAPSULAS 75 mg.** INDICACIONES. Tratamiento de la gripe en pacientes mayores de 12 años. Prevención post exposición en adultos y adolescentes mayores de 13 años no vacunados que han estado en contacto con un caso de influenza clínicamente diagnosticada, en época de brote epidémico (profilaxis de contactos de hogares familiares). Especialmente recomendada en ancianos vacunados o no vacunados de casas de reposo u hogares de ancianos cuando se detecta algún caso dentro de esa comunidad. **CONTRAINDICACIONES.** Hipersensibilidad al fosfato de oseltamivir o algún otro de los componentes de la formulación. **REACCIONES ADVERSAS.** Las reacciones adversas más frecuentemente notificadas fueron náuseas, vómitos. Estas reacciones son y se pueden producir con la primera dosis, por lo general.- Insomnio, cefalea y dolor abdominal con incidencia > 1%. Otras reacciones adversas menos frecuentes: diarrea, mareos, fatiga, congestión nasal, dolor de garganta y tos. **COMPOSICIÓN.** Cada cápsula contiene. Oseltamivir (como fosfato) 75 mg. Excipientes: almidón regelatinizado, croscarmelosa sódica, povidona K-30, talco, estearato de magnesio, dióxido de titanio (C.I.77891), colorante FD&C rojo N°40 (C.I.16035), colorante D&C amarillo N°10 (C.I.147005), colorante FD&C azul N°1 (C.I.42090), colorante D&C rojo N°28 (C.I.45410), c.s. Última actualización según Resol. 3762 del 09/06/2008.

**RIMIVAT® POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL 12 mg/mL.** INDICACIONES. Tratamiento de la gripe en adultos y niños de uno o más años de edad. Profilaxis de la gripe en los adultos y adolescentes igual o mayores de 13 años de edad. **NOTA:** El uso de antivirales para el tratamiento y prevención de la gripe deberá determinarse basándose en las recomendaciones oficiales, teniendo en cuenta la variabilidad epidemiológica y el impacto de la enfermedad en las diferentes áreas geográficas y poblaciones de pacientes. **CONTRAINDICACIONES.** Hipersensibilidad al fosfato de oseltamivir o algún otro de los componentes de la formulación. **EACCIONES ADVERSAS.** Las reacciones adversas más frecuentemente notificadas fueron náuseas, vómitos. Estas reacciones son y se pueden producir con la primera dosis, por lo general.- Insomnio, cefalea y dolor abdominal con incidencia > 1%. Otras reacciones adversas menos frecuentes: diarrea, mareos, fatiga, congestión nasal, dolor de garganta y tos. **COMPOSICIÓN.** Cada 100 g de polvo para suspensión oral contiene: Oseltamivir (como fosfato) 3,0 g Excipientes: goma xantán, ácido cítrico anhidro, citrato de sodio dihidrato, benzoato de sodio, sorbitol, sacarina sódica, sucralosa, dióxido de titanio, esencia menta fresca, esencia tutti frutti. c.s. Última actualización según Resol. 3788 del 09/06/2008.

Se desea recibir la información para prescribir completa de alguno de estos productos, escribanos a [informedica.ci@grunenthal.com](mailto:informedica.ci@grunenthal.com).  
Se desea reportar cualquier evento adverso favor comunicarse al 800 210 129 o escribanos a [drugsafety.ci@grunenthal.com](mailto:drugsafety.ci@grunenthal.com)

CÓD 66118428

# Enfrente EL RIESGO

proteja a los que más quiere

ANDRÓMACO