



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE COTRIMOXAZOL SUSPENSIÓN ORAL



Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su Médico o Farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponde exactamente al indicado por su Médico.

Composición:

Cada 5 mL de suspensión oral contiene:

Sulfametoxazol 200 mg

Trimetoprima 40 mg

Excipientes: Aspartamo, Sacarosa, Polisorbato 80, Metilparabeno, Propilparabeno, Sabor Naranja, Colorante FD&C Amarillo N° 6, Carmelosa Sódica, Simeticona, Carmelosa Sódica/Celulosa Microcristalina, Agua Purificada.

Indicación:

Tratamiento de infecciones bacterianas causadas por gérmenes sensibles a la asociación demostrado por antibiograma.

Clasificación:

Bactericida.

Usos:

Tratamiento de infecciones urinarias, neumonía, enteritis, otitis media aguda, infecciones del tracto respiratorio superior, bronquitis y gonorrea producidas por organismos susceptibles.

Advertencias y Precauciones:

Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.

- Usar con precaución en pacientes con daño renal o hepático, asma bronquial, deficiencia de folato, ancianos y en especial aquellos ancianos que toman diuréticos.
- Es importante administrar Cotrimoxazol por el tiempo completo de tratamiento prescrito.
- Cotrimoxazol puede aumentar la sensibilidad de la piel a los rayos solares.
- No debe ser usado en neonatos ni niños menores de 2 años.

Contraindicaciones:

Si su Médico no ha dispuesto otra cosa, Ud. no debe usar este medicamento en los siguientes casos:

- Embarazo y lactancia.
- Alergia a Sulfametoxazol, otra Sulfonamida, Trimetoprima, o a cualquier componente de la formulación o diuréticos tiazídicos (Hidroclorotiazida) o Clorpropamida o Tolbutamida.
- Pacientes con enfermedad hepática o renal severa, con deficiencia de glucosa-6-fosfato deshidrogenasa.

Interacciones:

El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros fármacos (interacciones). Ud. debe informar a su Médico si está tomando otros medicamentos, ya sea con o sin receta médica, especialmente si se trata de: Fenilolína, Ácido Valproico, Metotrexato, Metildopa, Rifampicina, antidiabéticos orales, fenotiazinas, diuréticos, Digoxina, anticonceptivos, antidepresivos tricíclicos (Amitriptilina, Imipramina). No olvide mencionar que está tomando este medicamento, en caso de requerir atención médica por otras razones, o en caso que se someta a algún examen.

Efectos Adversos (no deseados):

Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. Consulte inmediatamente al Médico si alguno de estos síntomas ocurre: prurito, dermatitis, rash cutáneo, fiebre, insomnio.

Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo, que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo: dolor de cabeza, diarrea, náuseas, vómitos, fatiga, pérdida de apetito, fotosensibilidad.

Forma de Administración:

Vía oral.

Dosis:

El Médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada: En niños mayores a 2 años se basa en el peso corporal de los pacientes y es de 20 a 30 mg de Sulfametoxazol y 4 a 6 mg de Trimetoprima por Kg de peso cada 12 horas. La dosis en adultos para infecciones bacterianas es de 800 mg de Sulfametoxazol y 160 mg de Trimetoprima cada 12 horas.

Sobredosis:

Conduzca inmediatamente al intoxicado a un Centro de Atención Médico.

Condiciones de Almacenamiento:

Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, luz y humedad, a no más de 25 °C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

**NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN CONSULTAR ANTES CON EL MÉDICO
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA**

V5
730949
21.05.14