

CON FECHA 30-7-2012

DOMPERIDONA  
CAMBIA CONDICIÓN  
DE VENTA.  
Res 001924

PHARMA  
**Genexx** 

## DOMPERIDONA COMPRIMIDOS 10 mg

### PROYECTO DE ROTULADO GRAFICO

ENVASE VENTA: Envase Secundario - Texto Estuche

DOMPERIDONA ✓  
Comprimidos ✓  
10 mg ✓

LOGO ✓

Contenido: X cápsulas comprimidos

Vía de Administración: Oral ✓

#### Composición:

Domperidona

10 mg ✓

Excipientes: Lactosa monohidrato, Almidón de maíz, Colorante FD&C azul N° 1 brillante,  
Benzoato de sodio, Gelatina, Estearato de magnesio c.s

#### Posología:

~~Según indicación médica.~~

Dosis adultos: 1 a 2 comprimidos cada 8 horas. } ~~eliminar~~

Dosis niños 7 a 12 años 1 a 2 comprimidos cada 8 horas. }

#### Modo de uso:

Tomar los comprimidos 15 a 20 minutos antes de las comidas. } ~~eliminar~~

#### Indicación:

Alivio de síntomas como náuseas, vómitos y sensación de dolor en el estomago. -> ~~eliminar~~

#### Duración del Tratamiento:


Si los síntomas persisten más de 5 días, consultar con su medico. -> ~~eliminar~~

Venta ~~bajo receta médica~~ directa en establecimientos tipo A y B. CAMBIO 30-7-2012.

#### Advertencias:

No utilizar con antiácidos, cimetidina, anticolinergicos. -> ~~eliminar~~

Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar a una temperatura no mayor a 25° C,  
protegido de la luz, calor y humedad.



## DOMPERIDONA COMPRIMIDOS 10 mg

### Contraindicaciones:

- Hipersensibilidad a la Domperidona.
- Hemorragia gastrointestinal.
- Tumor hipofisiario producto de prolactina.
- Embarazo y lactancia.

eliminado

Serie:

Vence:

Reg. I.S.P. N°:



Fabricado en Cadila Pharmaceuticals Ltd., Gujarat State, India. Importado por Pharma Genexx,  
Camino a Melipilla 7073, Cerrillos, Stgo. Distribuido por Droguería del Laboratorio Volta.  
Caupolicán 9291, Bodegas D y E, Quilicura – Santiago.

**DOMPERIDONA COMPRIMIDOS 10 mg**

**PROYECTO DE ROTULADO GRAFICO**

**ENVASE VENTA:** Envase Primario - Texto Blister de Aluminio

**DOMPERIDONA**  
**Comprimidos**  
**10 mg**

**LOGO**

Serie:  
Vence:  
Reg. I.S.P. N°:

INSTITUTO DE SALUD PUBLICA DE CHILE	
DEPARTAMENTO CONTROL NACIONAL	
SUBDEPTO REGISTRO	
UNIDAD PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SIMILARES	
0 8 SEP 2008	
N° Ref.	2119/08
N° Registro	F-17.090/08
Firma Profesional:	

Importado por Pharma Genexx S.A., Fabricado por Cadila Pharm. Ltd., India

**DOMPERIDONA COMPRIMIDOS 10 mg**


**PROYECTO DE ROTULADO GRAFICO**

**ENVASE MUESTRA MÉDICA: Envase Primario - Texto Blister de Aluminio**

**DOMPERIDONA  
Comprimidos  
10 mg**

**LOGO**

Serie:  
Vence:  
Reg. I.S.P. N°:



Importado por Pharma Genexx S.A., Fabricado por Cadila Pharm. Ltd., India



## DOMPERIDONA COMPRIMIDOS 10 mg

**Contraindicaciones:**

- Hipersensibilidad a la Domperidona.
- Hemorragia gastrointestinal.
- Tumor hipofisiario producto de prolactina.
- Embarazo y lactancia.

Serie:

Vence:

Reg. I.S.P. N°:



Fabricado en Cadila Pharmaceuticals Ltd., Gujarat State, India. Importado por Pharma Genexx, Camino a Melipilla 7073, Cerrillos, Stgo. Distribuido por ~~Droguería~~ del Laboratorio Volta. Caupolicán 9291, Bodegas D y E, Quilicura – Santiago.

## DOMPERIDONA COMPRIMIDOS 10 mg

### PROYECTO DE ROTULADO GRAFICO

ENVASE CLÍNICO: Envase Primario - Texto Blister de Aluminio

**DOMPERIDONA**  
**Comprimidos**  
**10 mg**

**LOGO**

Serie:  
Vence:  
Reg. I.S.P. N°:



Importado por Pharma Genexx S.A., Fabricado por Cadila Pharm. Ltd., India

## DOMPERIDONA COMPRIMIDOS 10 mg

### PROYECTO DE ROTULADO GRAFICO

ENVASE CLÍNICO: Envase Secundario - Texto Estuche

DOMPERIDONA  
Comprimidos  
10 mg

LOGO



Contenido: X cápsulas

Vía de Administración: Oral

#### Composición:

Domperidona 10 mg

Excipientes: Lactosa monohidrato, Almidón de maíz, Colorante ~~laca~~ FD&C Nº 1 azul brillante,  
Benzoato de sodio, Gelatina, Estearato de magnesio c.s

#### Posología:

~~Según indicación médica.~~

**Dosis adultos: 1 a 2 comprimidos cada 8 horas.**

**Dosis niños 7 a 12 años 1 a 2 comprimidos cada 8 horas.**

#### Modo de uso:

Tomar los comprimidos 15 a 20 minutos antes de las comidas.

#### Indicación:

Alivio de síntomas como náuseas, vómitos y sensación de dolor en el estomago.

#### Duración del Tratamiento:

Si los síntomas persisten más de 5 días, consultar con su medico.

~~Venta bajo receta médica en establecimientos tipo A.~~

Envase Clínico solo para establecimientos Médico – Asistenciales.

#### Advertencias:


**No utilizar con antiácidos, cimetidina, anticolinergicos.**

Mantener fuera del alcance de los niños. Almacenar a una temperatura no mayor a 25° C, protegido de la luz, calor y humedad.

## DOMPERIDONA COMPRIMIDOS 10 mg

**Contraindicaciones:**

- Hipersensibilidad a la Domperidona.
- Hemorragia gastrointestinal.
- Tumor hipofisiario producto de prolactina.
- Embarazo y lactancia.



Serie:

Vence:

Reg. I.S.P. N°:

Fabricado en Cadila Pharmaceuticals Ltd., Gujarat State, India. Importado por Pharma Genexx, Camino a Melipilla 7073, Cerrillos, Stgo. Distribuido por ~~Droguería del~~ Laboratorio Volta. Caupolicán 9291, Bodegas D y E, Quilicura – Santiago.