

Aluminio  
hidróxido  
Lch<sup>®</sup>

Vía Oral

Ver Sección Oral 6°

VER ANTES DE USAR

INDICACIONES

Indicaciones: 100 mL de suspensión contiene:

Aluminio 8 g

100 mL

Indicaciones:

Indicaciones: Mantener a temperaturas inferiores a 25 °C  
Evitar el uso de leche de los niños.

Indicaciones: Laboratorio Llaboratorio Chile S.A.

Indicaciones: Santiago - Chile.

Indicaciones: 19978, Santiago - Chile.

Indicaciones: 19978, Santiago - Chile.

Indicaciones: 19978, Santiago - Chile.

Indicaciones: 19978, Santiago - Chile.

Indicaciones: 19978, Santiago - Chile.

Indicaciones: 19978, Santiago - Chile.

Indicaciones: 19978, Santiago - Chile.

Indicaciones: 19978, Santiago - Chile.

Indicaciones: 19978, Santiago - Chile.

Indicaciones: 19978, Santiago - Chile.

Indicaciones: 19978, Santiago - Chile.

Indicaciones: 19978, Santiago - Chile.

Indicaciones: 19978, Santiago - Chile.

Indicaciones: 19978, Santiago - Chile.

Indicaciones: 19978, Santiago - Chile.

Indicaciones: 19978, Santiago - Chile.

Indicaciones: 19978, Santiago - Chile.

Indicaciones: 19978, Santiago - Chile.

Indicaciones: 19978, Santiago - Chile.

Indicaciones: 19978, Santiago - Chile.

Indicaciones: 19978, Santiago - Chile.

ALMACENAR  
VERTICALMENTE



LABORATORIO CHILE

E 11435 v6.0