

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
CARBORON COMPRIMIDOS 300 mg

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

Composición:

Cada comprimido contiene:

Carbonato de Litio 300 mg

Excipientes: Lauril sulfato de sodio, Celulosa microcristalina pH 101, Almidón glicolato de sodio, Gelatina polvo, Dióxido de Silicio coloidal, Croscarmelosa sódica, Estearato de magnesio

Clasificación Terapéutica:

Antipsicótico.

1.- ¿Para qué se usa?

Este medicamento se utiliza para el tratamiento y manutención de los episodios maniacos de la enfermedad bipolar tipo I y II en pacientes mayores de 12 años.

2.- Administración (oral)**- Rango y frecuencia**

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es: 900-1800 mg. al día. Las dosis posteriores deben ser individualizadas según la respuesta del paciente y según los niveles plasmáticos del medicamento.


- Consejo de cómo administrarlo

Se recomienda tomar el medicamento después de las comidas para evitar la irritación estomacal.

- Uso prolongado

Debe usarlo durante el tiempo que su médico se lo señale, respetando los horarios y las dosis.

FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
CARBORON COMPRIMIDOS 300 mg

Si utiliza por un largo periodo de tiempo este medicamento, debe visitar periódicamente a su médico.

3.- Precauciones

FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE

- Mayores de 60 años

Los ancianos son más sensibles a los efectos adversos de los medicamentos, por lo que debe seguir las indicaciones de su médico durante el tratamiento con carbonato de litio.

- Manejo de vehículos

Este medicamento puede causar en algunas personas mareos y / o disminuir sus capacidades mentales para reaccionar frente a imprevistos. Asegúrese del efecto que ejerce este medicamento sobre usted antes de manejar un vehículo o maquinaria peligrosa o realizar cualquier otra actividad riesgosa.

- Embarazo:

Este medicamento puede causar daño al feto, no se recomienda su uso durante este periodo. Utilice alguna medida anticonceptiva si está en etapa fértil y consume este medicamento. Hágale saber a su médico si está embarazada y requiere del uso de esta terapia.

-Lactancia:

Este medicamento pasa a la leche materna y puede provocar efectos adversos en el lactante, por lo que debe discutir con su médico la conveniencia de usar este medicamento o de suprimir la lactancia.

- Lactantes y niños:

Este medicamento puede debilitar los huesos de los niños, el pediatra debe evaluar el riesgo/beneficio de su administración.

- Precauciones especiales:

Se recomienda tomar bastante líquido y evitar exponerse a deshidratación, (no se recomienda acudir a saunas), ya que la pérdida de líquido y sales puede provocar la aparición de efectos adversos severos.

Siga rigurosamente las instrucciones de su médico acerca de hacer una dieta especial, tenga la certeza de usar suficiente sal en su dieta.

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
CARBORON COMPRIMIDOS 300 mg

4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:

Si ha presentado síntomas de alergia a carbonato de litio.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE

5.- Interacciones**- Medicamentos**

Usted debe informar a su médico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta. En este caso se han descrito las interacciones con los siguientes medicamentos: acetazolamida, furosemida, hidroclorotiazida u otros diuréticos, antiinflamatorios como ácido acetilsalicílico (aspirina), tetraciclina, metronidazol, clozapina, clorpromazina, haloperidol, teofilina, cafeína, acetazolamida.

- Enfermedades

Usted debe consultar a su médico, antes de tomar cualquier medicamento si presenta una enfermedad al hígado, riñón, cardiovascular o cualquier otra enfermedad crónica y severa.

En el caso particular de este medicamento, si padece de esquizofrenia, diabetes mellitus, dificultad par orinar, alguna infección, epilepsia, alguna enfermedad a la tiroides, enfermedad de Parkinson, leucemia.

- Alimentos

Se debe evitar consumir alimento y / o bebidas que contengan cafeína, como las bebidas colas, café y té, ya que estos alimentos son estimulantes y pueden alterar el tratamiento.

6.- Efectos adversos

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: reacción alérgica: picazón o ronchas, pulso irregular, cambios en el ritmo del corazón, dificultad para respirar, mareos, ganancia de peso, dolor y aparición de color azul en los dedos de pies y manos, dolor de cabeza, problemas de visión.

- Otros efectos

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
CARBORON COMPRIMIDOS 300 mg

adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: aumento en la frecuencia para orinar, sed, náuseas leves, ligero temblor de las manos, acné.

7.- Sobredosis

FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: diarrea, somnolencia, pérdida del apetito, debilidad muscular, náuseas o vómitos, dificultad para hablar, temblor, visión borrosa, confusión, convulsiones, mareos.

Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente, llevando el envase del medicamento que se ha tomado.

8.-Condiciones de almacenamiento:

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor luz y humedad a temperaturas inferiores a los 30°C.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico

No recomiende este medicamento a otra persona.

Registro ISP N° F-14910/05

Logo Royalpharma.