

Tocalm Adulto Ambroxol 30 mg/5mL Jarabe 100 mL





TOCALM

Laboratorio: PRATER

Drogas:

- Ambroxol

Acciones:

- Aparato Respiratorio:Antitusivos Expectorantes Mucolíticos

Acciones:

- **Jarabe pediátrico:**cada 5 ml contiene: Ambroxol 15 mg.**Jarabe adulto:**cada 5 ml contiene: Ambroxol 30 mg.
- Bronquitis aguda, bronquiectasias, traqueotomizados, bronquitis crónica, neumonía, bronquitis asmátiforme, gripe, bronconeumonías, pre-operatorio y post-operatorio, bronquitis tabáquica, EBOB, rinofaringitis, sinusitis.
- **Jarabe pediátrico:***Niños de hasta 2 años:* 2.5 ml (½ cucharadita) 2 veces al día. *Niños de 2-5 años:* 2.5 ml (½ cucharadita) 3 veces al día. *Niños de 5 a 12 años:* 5 ml (1 cucharadita) 3 veces al día.**Jarabe adulto:***Adultos y niños mayores de 12 años:* 5 ml (1 cucharadita) 3 veces al día.
- Hipersensibilidad al principio activo. No administrar en el primer trimestre del embarazo.
- Pacientes con úlcera gastroduodenal o con antecedentes de ella.
- **Jarabe pediátrico:**envase conteniendo 100 ml.**Jarabe adulto:**envase conteniendo 100 ml.

¿Para qué enfermedades o condiciones se prescribe este medicamento?

Ambroxol se utiliza para el tratamiento sintomático de tos productiva (tos con flema) a causa de bronquitis, resfrios u otras afecciones respiratorias en niños y adultos. La tos ocasional es una respuesta normal para mantener la garganta y vías respiratorias despejadas. Un episodio agudo no debería durar más de 3 semanas; las causas más comunes son resfrió, gripe, alergia o infecciones agudas del tracto respiratorio. En cambio, una tos crónica puede deberse a causas como asma, bronquitis crónica, enfermedad por reflujo esofágico, fumadores crónicos, entre otras. Si presenta tos persistente o si se acompaña de otros síntomas como fiebre o dificultad para respirar, es recomendable consultar con un médico.

¿Qué precauciones debo tener al usar este medicamento?

Ambroxol se encuentra contraindicado en pacientes con tos crónica y tos seca. Se debe tener precaución en pacientes con úlceras pépticas, ya que aumenta el riesgo de sangramiento. Dentro de sus efectos adversos se encuentran molestias gastrointestinales como náuseas y diarrea. Pacientes diabéticos: Este medicamento es apto para pacientes diabéticos, ya que no contiene azúcar en su formulación.



¿Cómo debo usar este producto?

Las cantidades recomendadas son: Hasta 2 años: jarabe infantil 2,5 mL (1/2 cucharadita de té), 2 veces al día. Entre 2 y 5 años: jarabe infantil 2,5 mL (1/2 cucharadita de té), 3 veces al día. Entre 5 y 12 años: jarabe infantil 5 mL (1 cucharadita de té), 3 veces al día. Entre 6 y 12 años: jarabe adulto 2,5 mL (1/2 cucharadita de té), 3 veces al día. Mayores de 12 años y adultos: jarabe adulto 5 mL (1 cucharadita de té), 3 veces al día.

Presentación

Este medicamento se presenta en forma de jarabe.

Modo de almacenamiento

Se debe almacenar a temperatura ambiente (no más de 25°C) y protegido de la luz. No requiere refrigeración.