

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

POTASIO GLUCONATO ELIXIR AL 31,2%

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, pregunte a su médico o farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

COMPOSICION Y PRESENTACION.

Cada 15 ml de elixir contiene:

Potasio gluconato 4.68 g

(Equivalente a 20 mEq de Potasio)

Excipientes: ~~Sacarina sódica dihidrato, colorante FD&C amarillo N° 5, metilparabeno,~~

~~esencia de piña hidrosoluble, alcohol etílico, agua purificada.~~

Según última fórmula aprobada en el registro sanitario.

CLASIFICACION: Electrolitoterapia: **Suplemento mineral**

INDICACIONES: ~~Hipokalemia (bajos niveles sanguíneos de potasio) de cualquier origen. Prevención de la hipokalemia en usuarios de diuréticos o esteroides.~~

Tratamiento y prevención de estados de hipokalemia, especialmente en la terapia corticosteroidea y de diuréticos que provocan la excreción de potasio.

ADVERTENCIAS: Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica.

CONTRAINDICACIONES: No usar en personas con insuficiencia renal retenedora de potasio. Uso asociado a diuréticos ahorradores de potasio. Hiperkalemia. (niveles altos de potasio).

INTERACCIONES: Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con los siguientes productos: Diuréticos ahorradores de potasio (Espironolactona y Triamtereno). Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (ECA), Ciclosporina.

EFFECTOS INDESEABLES: El uso de este medicamento puede producir los siguientes efectos que normalmente no requieren atención médica: diarrea, náuseas, dolor, malestar o gases en el estómago.

REACCIONES ADVERSAS: Si usted presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este producto, consulte a su médico: Hiperpotasemia caracterizada por: confusión, latidos cardíacos irregulares o lentos; hormigueo de manos, pies o labios; sensación de falta de aire o dificultad para respirar; cansancio o debilidad no habituales, pesadez en las piernas.

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE	
AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS	
SUBDEPTO. REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS	
OFICINA MODIFICACIONES	
N° 5. metilparabeno:	
27 AGO. 2014	
N° Ref.:	MTS45138/14
N° Registro:	F-2277/14
Firma Profesional:	

FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
POTASIO GLUCONATO ELIXIR AL 31,2%

PRECAUCIONES: Administrar con precaución en pacientes con insuficiencia renal, suprarrenal y deshidratación aguda. Evitar los alimentos ricos en potasio (naranjas, plátano) o fármacos que incluyan a este catión en su molécula (sales de potasio).

DOSIS: El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento apropiado a su caso en particular, no obstante la dosis usual recomendada es:

~~- 20 mEq (15 mL). Oral cada 8-12 horas.~~

La posología depende de las necesidades individuales del paciente. La dosis habitual para prevenir la hipokaliemia es de 20 mEq de potasio elemental (4,8g de gluconato de potasio) diarios, lo que equivale a 1 cucharadita (15 ml) de solución.

MODO DE EMPLEO: Administrar por vía oral, tomar mezclado con agua o jugos de fruta. Tomar con los alimentos o inmediatamente después de éstos.

SOBREDOSIS. En caso de sobredosis accidental, trasladar a la persona afectada a un centro asistencial de urgencia, para un tratamiento sintomático y de mantención (llevar este folleto informativo)

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener lejos del alcance de los niños; en su envase original; protegido del calor. No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

NO REPITA EL TRATAMIENTO SIN INDICACION MEDICA.
NO RECOMIENDE ESTE MEDICAMENTO A OTRA PERSONA.

**FOLLETO DE INFORMACION
AL PACIENTE**