

Ref.: RF232464/10

Reg. I.S.P. N° F-18718/11

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**LAX 3350 ADULTOS POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL EN SOBRES**

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**

**LAX 3350 ADULTOS ~~Y NIÑOS~~ POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL EN SOBRES**

**COMPOSICIÓN**

Cada sobre de Lax 3350 adultos contiene:

**Macrogol** Polietilenglicol 3350 17 g

~~Cada sobre de Lax 3350 niños contiene:~~

~~Polietilenglicol 3350 10 g~~

**CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA**

Laxante osmótico.

**DESCRIPCIÓN**

El polietilenglicol **macrogol** (PEG) 3350 es un polímero lineal de óxido de etileno.

El PEG **macrogol** 3350 es agente osmótico que, debido a su estructura, induce la retención de agua por la materia fecal, con lo cual ésta aumenta su volumen, reblandeciendo su consistencia y facilitando su eliminación.

**FARMACOCINÉTICA**

El PEG **macrogol** 3350 no se altera a lo largo del intestino. Realmente no se absorbe por el tracto gastrointestinal (debido a su elevado peso molecular) y no tiene actividad farmacológica conocida. En caso que se absorbiera, se excretaría por vía urinaria.

Cuando se usa como tratamiento del estreñimiento, la respuesta inicial se produce al cabo de 2-4 días.

No se ha demostrado que PEG **macrogol** 3350 tenga algún efecto sobre la absorción activa y la secreción de glucosa o electrolitos. No produce taquifilaxia.


**INDICACIONES**

Lax 3350 se indica como laxante en el tratamiento del estreñimiento ocasional.

**ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES**

Los pacientes con estreñimiento deben ser evaluados con una historia clínica detallada que incluya un examen físico completo para evaluar las condiciones metabólicas, endocrinas y neurológicas asociadas, así como la medicación concomitante que estén tomando y que pudiera contribuir o agravar la constipación. En algunos pacientes será importante realizar un estudio radiológico o endoscópico del colon.

Debe evitarse el uso de Lax 3350 en pacientes con síntomas sugerentes de obstrucción intestinal como: náuseas, vómitos, dolor abdominal o distensión, impactación fecal, estenosis o adherencias intestinales. Además se aconseja no usar este producto en caso de fiebre.



**FOLLETO DE INFORMACION  
AL PROFESIONAL**

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**LAX 3350 ADULTOS POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL EN**  
**SOBRES**

---

Los pacientes deben ser informados sobre hábitos alimenticios y defecatorios adecuados (como dietas con alto contenido de fibra) y cambios del estilo de vida (ingesta adecuada de líquidos y ejercicio regular) con el objetivo de mejorar el funcionamiento intestinal.

El uso frecuente, prolongado o excesivo de **PEG macrogol** 3350, puede ocasionar un desequilibrio hidroelectrolítico y dependencia a los laxantes.

La acción de los laxantes en pacientes con historia clínica de constipación puede no ser inmediata y requerir de 48 a 72 horas para producir movimiento intestinal.

**Embarazo y lactancia:**

Se desconoce si **PEG macrogol** 3350 puede causar daño fetal cuando es administrado durante el embarazo o que afecte la capacidad reproductiva. Dado que el ~~Polietilenglicol~~ **macrogol** prácticamente no se absorbe en el intestino, su empleo durante el embarazo o en el periodo de lactancia queda a juicio del médico.

**Pacientes pediátricos:**

No administrar **PEG macrogol** 3350 a menores de ~~3~~ **16** años de edad.

**Carcinogenicidad, Mutagenicidad y Fertilidad:**

No hay estudios de carcinogenicidad a largo plazo, ni estudios de toxicidad genética o de toxicidad reproductiva en animales.

No se han realizado estudios durante la reproducción en un modelo animal.

**CONTRAINDICACIONES**

Lax 3350 no debe ser utilizado en los siguientes casos:

- Pacientes que presenten hipersensibilidad al ~~Polietilenglicol~~ **macrogol** 3350.
- Pacientes con sospecha o diagnóstico de obstrucción intestinal.

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS**

**PEG Macrogol** 3350, no ha demostrado tener interacciones con otros medicamentos.

**REACCIONES ADVERSAS**

Puede presentarse: náuseas, inflamación abdominal, calambres y flatulencia. Las dosis altas pueden producir diarrea y un mayor número de evacuaciones.

**SOBREDOSIFICACIÓN**

No se han reportado casos de sobredosis. La producción de diarrea sería el evento esperado más importante. Ante una sobredosis de Lax 3350, se puede presentar deshidratación debida a la diarrea. Administrar líquidos suficientes.

INFORMACION  
AL PROFESIONAL

Ref.: RF232464/10

Reg. I.S.P. N° F-18718/11

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PROFESIONAL**  
**LAX 3350 ADULTOS POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL EN**  
**SOBRES**

---

**POSOLOGÍA**

Lax 3350 se administra vía oral.

La acción de los laxantes en pacientes con una historia clínica de estreñimiento puede no ser inmediata y requerir de 48 a 72 horas para producir movimiento intestinal.

Se sugiere no aumentar la dosis diaria ni la frecuencia de la administración, deberá esperarse la respuesta en un tiempo máximo de 72 horas.

**Adultos:** La dosis recomendada de Lax 3350 para el estreñimiento es de 17 g de polvo por día durante 7 a 14 días **como máximo**.

~~**Niños:** Para pacientes de 3 años en adelante, se recomiendan 10 g por día, durante 7 a 14 días.~~

**Modo de uso:**

El contenido de un sobre de Lax 3350 debe ser disuelto en 200 mL de agua hervida o purificada, jugo, bebida, café o té y se sugiere tomarlo por la mañana.

