



MINTLAB

Dicogel Diclofenaco Dietilamonio 1,16% Gel Tópico 30 gr





DICOGEL Gel

Laboratorio: MINTLAB

Drogas:

- Diclofenac, dietilamina

Acciones:

- Aparato Locomotor: Analgésicos
- Aparato Locomotor: Antiinflamatorios no Esteroides

Acciones:

- Cada 100 g de gel contiene: Diclofenaco Dietilamina 1.16 g (expresado como 1 g de Diclofenaco Sódico). Excipientes: Carbómero, Metilparabeno, Propilparabeno, Isopropanol, Etanol, Trietanolamina, Agua Purificada.
- Analgésico y antiinflamatorio no esteroideal.
- Indicado para el alivio sintomático local del dolor y la inflamación.
- **Vía de administración:** tópica. Equivalente al volumen de una cereza o nuez.
- Signos y síntomas como picor, rubor, edema, pápulas, ampollas o descamación de la piel. En casos muy aislados se han informado la aparición de reacciones sistémicas como es el exantema generalizado; reacciones de hipersensibilidad (ataque de asma, angioedema), reacciones de fotosensibilidad. Al aplicar en zonas relativamente extensas de la piel y durante un período prolongado, no se puede excluir la posibilidad de efectos secundarios sistémicos durante el tratamiento tópico con diclofenaco dietilamina gel.
- **No usar en:** Pacientes a los que el ácido acetilsalicílico u otros fármacos antiinflamatorios no esteroideos puedan provocarles ataque de asma, urticaria o rinitis aguda. Embarazo y lactancia. No aplicar sobre heridas abiertas cortantes o quemaduras. No debe usar AINEs con excepción de ácido acetilsalicílico en el período inmediato a una cirugía de by pass coronario.
- No utilizar en mujeres embarazadas y durante la lactancia salvo indicación médica. No utilizar en menores de 15 años. Usar con precaución si existen antecedentes de problemas renales o hepáticos. Después de 2 semanas de tratamiento es recomendable realizar una evaluación del tratamiento. Debe aplicarse únicamente en superficies cutáneas sanas e intactas, sin heridas ni lesiones abiertas. Evitar el contacto con los ojos o las mucosas. No ingerir. Lavar las manos después de la aplicación del gel, salvo que éstas sean las zonas tratadas. Ud. debe consultar a su médico antes de usar AINEs (con excepción de ácido acetilsalicílico), si tiene o ha tenido alguna enfermedad al corazón (como angina de pecho, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca). Debe comunicar a su médico si sufre o ha sufrido problemas de sangramiento gastrointestinal o úlceras estomacales.
- No se han detectado interacciones con otros medicamentos al administrar diclofenaco dietilamina gel por vía tópica.
- **Condiciones de almacenamiento:** A no más de 25 °C. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

