

**UNGENTAX UNGÜENTO OFTÁLMICO 0,3%
FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE****UNGENTAX UNGÜENTO OFTÁLMICO 0,3%**

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este Medicamento.

Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente.

Composición

Cada gramo de ungüento oftálmico contiene:

Gentamicina (como Sulfato) 3 mg

Excipientes: Vaselina sólida c.s.

Categoría

Antibacteriano

INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS SUBDEPTO. REGISTRO UNIDAD PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SIMILARES
03 ABR 2012
N° Ref.: RF 295239/11
N° Registro: B-2250/12
Firma Profesional: <i>[Firma]</i>

Indicaciones

Para el tratamiento de infecciones bacterianas de las estructuras superficiales del ojo producidas por microorganismos sensibles a gentamicina, como por ejemplo conjuntivitis, queratitis, queratoconjuntivitis, úlceras corneales, blefaritis, blefaroconjuntivitis, meibomianitis y dacriocistitis. También está indicado en profilaxis de infecciones oculares postoperatorias

~~Infecciones en los ojos simples y mixtas, heridas oculares, conjuntivitis aguda. Ungüento oftálmico de Sulfato de Gentamicina es efectivo en el tratamiento de infecciones bacterianas externas del ojo y párpado, pre y post operatorio.~~

Farmacología/Farmacocinética**Farmacología:**

~~Gentamicina es bactericida en acción (elimina bacterias). Esto se logra, ya que la bacteria produce proteínas defectuosas, esenciales para su crecimiento. Una vez que las bacterias han sido eliminadas, los tejidos del ojo pueden ser reparados por el proceso curativo normal. Es un potente antibiótico que cuenta con un amplio espectro de acción contra la Ps. aeruginosa y la mayoría de las cepas de Proteus, E. coli, Klebsiella, Enterobacter y Serratia.~~

Farmacocinética:

~~Gentamicina tiene una pobre absorción después de la administración oral, pero es rápidamente absorbida después de la inyección intramuscular, con concentraciones máximas en el plasma en 0,5-1h.~~

UNGENTAX UNGÜENTO OFTÁLMICO 0,3% FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE

Precauciones/Advertencias:

El uso de este medicamento exige diagnóstico y supervisión médica.

Si la irritación persiste o se incrementa se debe discontinuar su uso y se debe consultar al médico. No tocar la punta del tubo ya que puede contaminar el ungüento. Mantenga el tubo rigurosamente cerrado después de su uso. Utilice dentro de un mes después de abierto. Descontinúe la terapia y consulte a su médico inmediatamente ante cualquier signo de sensibilidad como picazón, enrojecimiento o sensación de ardor.

No se recomienda el uso de lentes de contacto durante el curso de una infección ocular.

Interacciones

No se reportan.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PACIENTE**

Efectos adversos

Se han reportado las siguientes reacciones adversas locales: ardor, picazón, irritación, sequedad, foliculitis, hipertrichosis, erupciones acneiformes, hipo pigmentación, dermatitis perioral alérgica de contacto, etc.

Sobredosis

No se prevé una toxicidad clínicamente importante y no hay tratamiento específico requerido.

Información general de dosificación

Su uso es como lo indique el médico.

Inicie la aplicación lavando bien sus manos y ubicándose frente a un espejo.

Inclinar la cabeza hacia atrás, presionar su dedo suavemente sobre la piel justo debajo del párpado inferior, tire el párpado inferior, separándolo del ojo para hacer un espacio. Exprima una tira delgada de ungüento tire del párpado inferior, separándolo del ojo para hacer un espacio. Una tira de 1 cm (aproximadamente 1 / 3 de pulgada) de ungüento usualmente es suficiente, a menos que haya sido informado por su médico para utilizar una cantidad diferente. Suelte el párpado y cierre suavemente los ojos. Mantenga los ojos cerrados por 1 ó 2 minutos para permitir que el medicamento entre en contacto con la infección. Para mantener el medicamento lo libre de gérmenes como sea posible, no toque la punta del aplicador con ninguna superficie (incluyendo el ojo). Después de usar el ungüento

**UNGENTAX UNGÜENTO OFTÁLMICO 0,3%
FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE**

oftálmico de Gentamicina, limpie la punta del tubo de ungüento con un papel limpio y mantenga el tubo bien cerrado.

Posteriormente lave sus manos para remover cualquier resto de medicamento adherido.

Cumpla estrictamente el tiempo de tratamiento que el médico le ha señalado, aún si antes de completar ese tiempo los síntomas de la enfermedad desaparecen o mejoran.

Este medicamento es de uso personal, no debe ser usado por otra persona, pues corre el riesgo de contraer una infección en los ojos.

Una vez terminado el tratamiento debe desechar lo que sobra de este medicamento.

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar a temperatura menor a 30 °C.

Mantener lejos del alcance de los niños.

No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.

No recomiende este medicamento a otra persona.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PACIENTE**