


**Ref. N°: RF427739/13      Reg. I.S.P. N°: F-20082/13**  
**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE**  
**CLORANFENICOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,5%**

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está segura de algo pregunte a su médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto, puede necesitar leerlo nuevamente.



**COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN:**

Cada 100 mL de solución **oftálmica** contiene:

Cloranfenicol 0,5 g

**Excipientes:** Feniletilalcohol, Cloruro de sodio, Borax, Ácido Bórico, Edetato disódico, Metabisulfito de sodio, Polietilenglicol **Macrogol**, Agua **purificada para inyectables**, c.s.

**1.- ¿Para qué se usa?**

Este medicamento está indicado en el tratamiento de infecciones oculares superficiales que involucren la conjuntiva y / o córnea causadas por organismos susceptibles.

**Este medicamento exige diagnóstico y supervisión médica.**

**2.- Administración (oftálmico)**

**- Rango y frecuencia**

El médico debe indicar la posología y el tipo de tratamiento a su caso particular, no obstante la dosis usual recomendada es 1 a 2 gotas 4 a 6 veces al día las primeras 72 horas según la severidad del cuadro, las aplicaciones pueden ser distanciadas luego de los dos primeros días. Se recomienda seguir aplicando el medicamento 48 horas después de haber logrado una cura aparente.

Debe evitar olvidar alguna aplicación y respetar los horarios. Si no cumple el tratamiento lo más probable es que la enfermedad se vuelva a presentar con mayor intensidad y este medicamento ya no le servirá para detener la infección.

**- Consejo de cómo administrarlo**

Antes de aplicar este medicamento debe lavarse muy bien las manos.

Luego de aplicar el medicamento en los ojos debe mantenerlos **cerrados por 1 a 2 minutos**.

Debe evitar tocar con la punta del aplicador la zona infectada.

**Use la solución oftálmica dentro de 21 días después de abierto el envase.**

**- Uso prolongado**

No lo use por o menos tiempo que el señalado por su médico.

**3.- Precauciones**

**- Mayores de 60 años**

No existe recomendación especial para los ancianos.

**- Manejo de vehículos**

Es poco probable que el medicamento afecte su capacidad de concentración y estado de alerta.

**FOLLETO DE INFORMACIÓN  
AL PACIENTE**

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE  
CLORANFENICOL SOLUCIÓN OFTÁLMICA 0,5%****- Embarazo**

Este medicamento se absorbe en cantidades mínimas, es poco probable que dañe al feto.

**- Lactancia**

Este medicamento no pasa a la leche materna.

**- Lactantes y niños**

El uso de este medicamento en niños debe ser previa consulta a su pediatra.

**- Precauciones especiales**

Si después de unos días, sus síntomas no mejoran o empeoran debe consultar con su médico.

**4.- Usted no debe tomar este medicamento en los siguientes casos:**

Si ha presentado síntomas de alergia al medicamento.

Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.

**5.- Interacciones****- Medicamentos**

Usted debe consultar con su médico la conveniencia de usar este medicamento, si está utilizando otros, aunque al aplicarlo sobre los ojos el riesgo de interacciones es bajo.

**6.- Efectos adversos**

Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: palidez de la piel, dolor de garganta, fiebre, mareos inusuales.

**- Otros efectos**

Pueden presentarse otros efectos que habitualmente no necesitan atención médica, los cuales pueden desaparecer durante el tratamiento, a medida que su cuerpo se adapta al medicamento. Sin embargo consulte a su médico si cualquiera de estos efectos persisten o se intensifican: sensación de ardor o quemazón.

**7.- Sobredosis**

Los síntomas de sobredosis corresponden a una intensificación de los efectos adversos descritos, tales como: náuseas, vómitos, diarrea, sabor desagradable en la boca. Debe recurrir a un centro asistencial para evaluar la gravedad de la intoxicación y tratarla adecuadamente. Debe llevar el envase del medicamento que se ha tomado.

**8.-Condiciones de almacenamiento:**

Mantener lejos del alcance de los niños, mantener en su envase original, protegido del calor, luz y humedad a temperaturas ~~entre 2—8°~~ no más de 25° C.

**No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.**

**No repita el tratamiento sin consultar antes con el médico.**

**No recomiende este medicamento a otra persona.**

**FOLLETO DE INFORMACIÓN  
AL PACIENTE**