

# Titulación estable y más segura

1

## Iniciando Toujeo® correctamente<sup>6</sup>



Pacientes DM2 en terapia Oral

Iniciar: 0,2 U/Kg

Dosis calculada basado en peso

Rango de peso\*  
50-75 kg



Rango de dosis  
10-15 U/día




Pacientes DM2 en terapia con  
insulina basal una vez al día

Conversión 1:1

No se requiere recalcular la dosis

- En pacientes con insulina basal dos veces al día: utilizar el **80% de la dosis total diaria anterior de insulina basal**<sup>6</sup>

 **Toujeo®** Se aplica una vez al día, con el beneficio de dosificación flexible ( $\pm$  3 horas) cuando se necesite<sup>6</sup>


\* El rango de peso que se muestra es meramente ilustrativo y el cálculo de dosis no se limita a este rango.



2

## Titulación efectiva para alcanzar el objetivo de sus pacientes DM2\*<sup>4,7,8</sup>

Titular la dosis de Toujeo® a una frecuencia no superior a cada 3 a 4 días<sup>†</sup>



<sup>†</sup> Sólo para fines ilustrativos; basado en el algoritmo de titulación utilizado en los estudios EDITION 1, 2 y 3<sup>1,2,7</sup>

<sup>§</sup> Ante un evento hipoglucémico, reducir la dosis a discreción del médico.

<sup>\*</sup> El algoritmo de titulación para las personas con DM2 se basa en los estudios EDITION 1, 2 y 3. Incrementar la insulina en 6 unidades cada 7 días (basado en las 3 mediciones anteriores) si la mediana del AMG es  $\geq 140$  mg/dL ( $\geq 7.8$  mmol/L), y aumentar en 3 unidades si es  $> 100$  y  $< 140$  mg/dL ( $> 5.6$  y  $< 7.8$  mmol/L). Disminuir en -3 unidades o a criterio médico si es  $< 60$  mg/dL ( $< 3.3$  mmol/L) o si se presentan  $\geq 2$  episodios de hipoglucemia sintomática o 1 episodio de hipoglucemia severa en la semana anterior.

<sup>‡</sup> Mediana de glicemia de ayuno por AMG de los últimos 3 días. Toujeo® siempre se administró en la noche.

AMG: Automonitoreo de glicemia

  
**Toujeo®**  
Insulina glargina 300 U/mL

Para un mañana más estable<sup>1,3</sup>