

ROTULADO GRÁFICO
ELCAL D 500/800 CÁPSULAS


**LABORATORIOS ANDROMACO S.A.****Estuche venta público****Cara N°1:****ELCAL-D 500/800**

Calcio 500 mg / Vitamina D 800 U.I.

X cápsulas

Vía oral

Laboratorios Andrómaco S.A.

**Cara N°2:****ELCAL-D 500/800**

Cada cápsula contiene:

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Calcio (como carbonato de calcio) | 500 mg |
| Colecalciferol | 8,0 mg |
| (Equivalente a 800 U.I.) | |

Excipientes: almidón glicolato de sodio, polividona, laurilsulfato de sodio, dióxido de silicio coloidal, colorante FD&C azul N° 1, colorante FD&C rojo N° 40, dióxido de titanio. c.s.

Reg. I.S.P. N°

Cara N°3:**Recomendaciones de uso:**

~~Este medicamento está indicado como suplemento en estados carenciales de Calcio y Vitamina D₃.~~

Administración y dosis vía oral:

~~La dosis usual para adultos es de 1 a 2 cápsulas al día. No administrar a niños menores de 12 años sin indicación médica. No debe tomar el calcio en forma conjunta con otros medicamentos (especialmente: tetraciclina, fluoruros, cimetidina, ranitidina, famotidina). Debe tomarlo 1 a 2 horas después de haber ingerido el otro medicamento. Se recomienda tomar este medicamento junto con alguna comida. Tome el medicamento con un vaso lleno de agua o jugo.~~

ROTULADO GRÁFICO
ELCAL D 500/800 CÁPSULAS**LABORATORIOS ANDROMACO S.A.**

~~—Uso prolongado: A pesar que el calcio y la vitamina D₃ son necesarios para el organismo, un consumo excesivo o por un periodo prolongado de este medicamento sin control periódico de su médico, puede conducir a efectos dañinos severos sobre su salud.~~

Precauciones y advertencias:

~~No administrar a niños menores de 12 años sin prescripción médica. No exceda la dosis recomendada, salvo expresa indicación médica. Evite el uso concomitante de otros suplementos de vitaminas y minerales.~~

~~—Consumo de alcohol: No consuma grandes cantidades de alcohol, café y tabaco, durante el tratamiento con calcio y vitamina D₃, ya que éstos pueden disminuir la absorción del medicamento.~~

~~—Embarazo: Es muy importante que ingiera calcio y vitamina D₃ durante el embarazo, pero un exceso de este suplemento puede ser dañino para la madre y/o el feto. El uso de este medicamento durante el embarazo y lactancia debe ser bajo prescripción médica.~~

~~—Lactancia: Es muy importante que ingiera calcio y vitamina D₃ durante el periodo de lactancia, pero un exceso de este suplemento puede ser dañino para la madre y/o el lactante.~~

~~—Lactantes y niños: Este medicamento en altas dosis puede retardar el crecimiento normal del niño, el pediatra debe ser quien le indique la dosis necesaria para el niño. El uso de este medicamento en lactantes y niños debe ser bajo prescripción médica.~~

Contraindicaciones:

~~Si ha presentado síntomas de alergia al calcio carbonato y/o vitamina D₃. Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.~~

Efectos adversos:

~~Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: mareos, sensación de calor, arritmias, náuseas, vómitos, sudoración, dolor de estómago, debilidad, constipación severa, sed, gusto metálico, boca seca, irritabilidad, pérdida del apetito, ritmo cardíaco irregular, dificultad para orinar.~~

~~Para mayor información lea el folleto interno, si tiene dudas consulte a su médico o farmacéutico.~~

INSTRUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE
AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS
SUBDEPTO. REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS
OFICINA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS NUEVOS

25 MAY 2012

N° Ref.: RF296181/11
N° Registro: F-19426/12
Firma Profesional:

ROTULADO GRÁFICO
ELCAL D 500/800 CÁPSULAS

**LABORATORIOS ANDROMACO S.A.**

Manténgase fuera del alcance de los niños, almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz, a no más de 30°C.

No administrar junto con tetraciclinas porque puede inactivarlas.

Venta directa Bajo Receta Médica en establecimientos tipo A y B

Cara N°4:

Elaborado y distribuido en Chile por
Laboratorios Andrómaco S.A.
Av. Quilín 5273, Peñalolén, Santiago


Aleta superior:

ELCAL-D 500/800
Calcio 500 mg / Vitamina D 800 U.I.

X cápsulas

Aleta inferior:

Serie:
Vence:



Ref.: RF296181/11

Reg.ISP N°:F-19426/12

ROTULADO GRÁFICO
ELCAL D 500/800 CÁPSULAS



LABORATORIOS ANDROMACO S.A.

Blister venta público

ELCAL-D 500/800

Calcio 500 mg / Vitamina D 800 U.I.

Cápsulas

Serie:

Vence:

Laboratorios Andrómaco S.A.

Reg. I.S.P. N°

| | |
|--|--------------|
| INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE | |
| AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS | |
| SUBDEPTO. REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS | |
| OFICINA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS NUEVOS | |
| 25 MAY 2012 | |
| N° Ref.: | RF 296181/11 |
| N° Registro: | F-19426/12 |
| Firma Profesional: | |

ROTULADO GRÁFICO
ELCAL D 500/800 CÁPSULAS

**LABORATORIOS ANDROMACO S.A.****Estuche muestra médica****Cara N°1:****ELCAL-D 500/800**


Calcio 500 mg / Vitamina D 800 U.I.

X cápsulas

Vía oral

Muestra médica – Prohibida su venta

Laboratorios Andrómaco S.A.

**Cara N°2:****ELCAL-D 500/800**

Cada cápsula contiene:

Calcio (como carbonato de calcio) 500 mg

Colecalciferol 8,0 mg

(Equivalente a 800 U.I.)

Excipientes: almidón glicolato de sodio, polividona, laurilsulfato de sodio, dióxido de silicio coloidal, colorante FD&C azul N° 1, colorante FD&C rojo N° 40, dióxido de titanio. c.s.

Reg. I.S.P. N°

Cara N°3:**Recomendaciones de uso:**

~~Este medicamento está indicado como suplemento en estados carenciales de Calcio y Vitamina D₃.~~

Administración y dosis vía oral:

~~La dosis usual para adultos es de 1 a 2 cápsulas al día. No administrar a niños menores de 12 años sin indicación médica. No debe tomar el calcio en forma conjunta con otros medicamentos (especialmente: tetraciclina, fluoruros, cimetidina, ranitidina, famotidina). Debe tomarlo 1 a 2 horas después de haber ingerido el otro medicamento. Se recomienda tomar este medicamento junto con alguna comida. Tome el medicamento con un vaso lleno de agua o jugo.~~

ROTULADO GRÁFICO
ELCAL D 500/800 CÁPSULAS**LABORATORIOS ANDROMACO S.A.**

~~—Uso prolongado: A pesar que el calcio y la vitamina D₃ son necesarios para el organismo, un consumo excesivo o por un periodo prolongado de este medicamento sin control periódico de su médico, puede conducir a efectos dañinos severos sobre su salud.~~

Precauciones y advertencias:

~~No administrar a niños menores de 12 años sin prescripción médica. No exceda la dosis recomendada, salvo expresa indicación médica. Evite el uso concomitante de otros suplementos de vitaminas y minerales.~~

~~—Consumo de alcohol: No consuma grandes cantidades de alcohol, café y tabaco, durante el tratamiento con calcio y vitamina D₃, ya que éstos pueden disminuir la absorción del medicamento.~~

~~—Embarazo: Es muy importante que ingiera calcio y vitamina D₃ durante el embarazo, pero un exceso de este suplemento puede ser dañino para la madre y/o el feto. El uso de este medicamento durante el embarazo y lactancia debe ser bajo prescripción médica.~~

~~—Lactancia: Es muy importante que ingiera calcio y vitamina D₃ durante el periodo de lactancia, pero un exceso de este suplemento puede ser dañino para la madre y/o el lactante.~~

~~—Lactantes y niños: Este medicamento en altas dosis puede retardar el crecimiento normal del niño, el pediatra debe ser quien le indique la dosis necesaria para el niño. El uso de este medicamento en lactantes y niños debe ser bajo prescripción médica.~~


Contraindicaciones:

~~Si ha presentado síntomas de alergia al calcio carbonato y/o vitamina D₃. Si ha presentado alergia a alguno de los excipientes de la formulación.~~

Efectos adversos:

~~Existen efectos que se presentan rara vez, pero son severos y en caso de presentarse debe acudir en forma inmediata al médico: mareos, sensación de calor, arritmias, náuseas, vómitos, sudoración, dolor de estómago, debilidad, constipación severa, sed, gusto metálico, boca seca, irritabilidad, pérdida del apetito, ritmo cardíaco irregular, dificultad para orinar.~~

~~Para mayor información lea el folleto interno, si tiene dudas consulte a su médico o farmacéutico.~~



ROTULADO GRÁFICO
ELCAL D 500/800 CÁPSULAS

**LABORATORIOS ANDROMACO S.A.**

Manténgase fuera del alcance de los niños, almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz, a no más de 30°C.

No administrar junto con tetraciclinas porque puede inactivarlas.

Venta directa Bajo Receta Médica en establecimientos tipo A y B

Cara N°4:

Elaborado y distribuido en Chile por
Laboratorios Andrómaco S.A.
Av. Quilín 5273, Peñalolén, Santiago

Aleta superior:**ELCAL-D 500/800**

Calcio 500 mg / Vitamina D 800 U.I.

Muestra médica – Prohibida su venta

X cápsulas

Aleta inferior:

Serie:

Vence:

| |
|---|
| INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS SUBDEPTO. REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS OFICINA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS NUEVOS |
| 25 MAY 2012 |
| N° Ref.: RF 296181/11 |
| N° Registro: F-19426/12 |
| Firma Profesional: |

Ref.: RF296181/11

Reg.ISP N°:F-19426/12

ROTULADO GRÁFICO
ELCAL D 500/800 CÁPSULAS



LABORATORIOS ANDROMACO S.A.

Blister muestra médica

ELCAL-D 500/800

Calcio 500 mg / Vitamina D 800 U.I.

Cápsulas


Muestra médica – Prohibida su venta

Serie:

Vence:

Laboratorios Andrómaco S.A.

Reg. I.S.P. N°

| |
|---|
| INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS SUBDEPTO. REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS OFICINA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS NUEVOS |
| 25 MAY 2012 |
| N° Ref.: RF 296181/11 |
| N° Registro: E-19426/12 |
| Firma Profesional:  |

Ref.: RF296181/11

Reg.ISP N°:F-19426/12

ROTULADO GRÁFICO
ELCAL D 500/800 CÁPSULAS



LABORATORIOS ANDROMACO S.A.

Estuche envase clínico

ELCAL-D 500/800

Calcio 500 mg / Vitamina D 800 U.I.

X cápsulas

Vía oral

Envase clínico sólo para establecimientos asistenciales

Laboratorios Andrómaco S.A.

Cada cápsula contiene:

Calcio (como carbonato de calcio) 500 mg

Colecalciferol 8,0 mg

(Equivalente a 800 U.I.)

Excipientes: almidón glicolato de sodio, polividona, laurilsulfato de sodio, dióxido de silicio coloidal, colorante FD&C azul N° 1, colorante FD&C rojo N° 40, dióxido de titanio. c.s.

Reg. I.S.P. N°

| | |
|--|--------------|
| INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE | |
| AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS | |
| SUBDEPTO. REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS | |
| OFICINA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS NUEVOS | |
| 25 MAY 2012 | |
| N° Ref: | RF 296181/11 |
| N° Registro: | F-19426/12 |
| Firma Profesional: | |

Manténgase fuera del alcance de los niños, almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz, a no más de 30°C.

No administrar junto con tetraciclinas porque puede inactivarlas.

Venta directa ~~Bajo Receta Médica~~ en establecimientos tipo A y B

Elaborado y distribuido en Chile por

Laboratorios Andrómaco S.A.

Av. Quilín 5273, Peñalolén, Santiago

Serie:

Vence:

Ref.: RF296181/11

Reg.ISP N°:F-19426/12

ROTULADO GRÁFICO
ELCAL D 500/800 CÁPSULAS



LABORATORIOS ANDROMACO S.A.

Blister envase clínico

ELCAL-D 500/800

Calcio 500 mg / Vitamina D 800 U.I.

Cápsulas

Serie:

Vence:

Laboratorios Andrómaco S.A.

Reg. I.S.P. N°

| | |
|--|-----------------|
| INSTITUTO DE SALUD PÚBLICA DE CHILE | |
| AGENCIA NACIONAL DE MEDICAMENTOS | |
| SUBDEPTO. REGISTRO Y AUTORIZACIONES SANITARIAS | |
| OFICINA PRODUCTOS FARMACÉUTICOS NUEVOS | |
| 25 MAY 2012 | |
| N° Ref: | RF 296 181 / 11 |
| N° Registro: | F - 19426 / 12 |
| Firma Profesional: | |