

MINTLAB

Neohysticlar Desloratadina 2,5 mg / 5 mL Jarabe 90 mL



NEOHYSTICLAR Jarabe

Laboratorio: MINTLAB

Drogas:

- Desloratadina

Acciones:

- Aparato Respiratorio: Antialérgicos Antihistamínicos

Acciones:

- Cada 5 ml de jarabe contiene: Desloratadina 2.5 mg. Excipientes: Polividona, Propilenglicol, Sorbitol Solución al 70%, Sacarina Sódica, Ciclamato de Sodio, Metilparabeno, Esencia Manzana, Agua Purificada.
- Antihistamínico (antialérgico).
- Alivio de los síntomas asociados con la rinitis alérgica estacional.

- **Forma de administración:** Vía oral. Se puede administrar con o sin alimentos. **Dosis:** El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular. No obstante, la dosis usual recomendada en niños de 2 a 5 años es de 2.5 ml de jarabe (1.25 mg) 1 vez al día. En niños de 6 a 11 años la dosis usual es de 5 ml de jarabe (2.5 mg) 1 vez al día.
- Los medicamentos pueden producir algunos efectos no deseados además de los que se pretende obtener. **Consulte inmediatamente al médico si alguno de estos síntomas ocurre:** reacciones de hipersensibilidad, dificultad al respirar. **Otros efectos son temporales y no requieren atención médica, salvo que estos sean muy molestos o se prolonguen en el tiempo:** dolor de cabeza, fatiga, mareos, sequedad de la boca, dolor de músculos.
- **No usar en pacientes con:** Hipersensibilidad a la desloratadina, loratadina o algún componente de la formulación. Lactancia.
- Úsese sólo por indicación y bajo supervisión médica. Administrar con precaución en pacientes con enfermedad hepática o renal. Si Ud. está embarazada, consulte a su médico antes de empezar a tomar este medicamento. A las dosis recomendadas, la administración de desloratadina no debiera causarle somnolencia.
- El efecto de un medicamento puede modificarse por su administración junto con otros (interacciones). Ud. debe comunicar a su médico o farmacéutico de todos los medicamentos que está tomando, ya sea con o sin receta médica, antes de usar este fármaco. No olvide mencionar que Ud. está tomando este medicamento en caso de requerir atención médica por otras razones, o en caso que se someta a algún examen.
- En caso de ingestión involuntaria, conduzca al intoxicado a un centro de atención médico.
- **Condiciones de almacenamiento:** Manténgase fuera del alcance de los niños, en su envase original, protegido del calor, la luz y la humedad, a no más de 25 °C. No usar este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.