

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE VITAMINA ADC SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES

~~INSTRUCTIVO:~~

~~FOLLETO DE INFORMACION AL PACIENTE
VITA NAT SOLUCION PARA GOTAS ORALES~~

Lea cuidadosamente este folleto antes de la administración de este medicamento. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo pregunte a su médico o químico farmacéutico. Guarde este folleto puede necesitar leerlo nuevamente. Verifique que este medicamento corresponda exactamente al indicado por su médico.

COMPOSICIÓN Y PRESENTACIÓN:

VITAMINA ADC SOLUCION PARA GOTAS ORALES FÓRMULA:

Cada dosis de 24 gotas (0,6 mL) contiene:

Vitamina A 5.000 U.I. (1,5 mg)

(como Retinol Palmitato)


Vitamina D3 1.000 U.I. (25 mcg)

(Colecalciferol)

Vitamina C 75 mg

(como ascorbato)

Excipientes c.s.: aceite de castor hidrogenado, esencia de naranjas, esencia de caramelo, esencia menta piperita, galato de propilo, metilparabeno, propilparabeno, butilhidroxitolueno, butilhidroxianisol, edetato disódico dihidrato, ácido cítrico anhidro, =citrato de sodio dihidrato, sacarosa, sucralosa, agua purificada.



INDICACIONES:

Prevención y tratamiento de los estados carenciales de vitaminas A, D y C en lactantes y niños.

CLASIFICACION GRUPO TERAPÉUTICO

~~Polivitamínico~~ **Combinación de vitaminas**

ADVERTENCIAS:

Usese sólo por indicación y bajo supervisión médica.

FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PACIENTE

CONTRAINDICACIONES:

No usar en personas que presenten hipersensibilidad a algún componente de la

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE VITAMINA ADC SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES

formulación.

No usar en personas que presenten hipervitaminosis, hipercalcemia, insuficiencia renal o hepática.

- y en pacientes con sensibilidad incrementada al retinol, colecalciferol o ácido ascórbico.

--Tratamiento concomitante con Vit A y tretinoíno

INTERACCIONES:

Informe a su médico de todos los medicamentos que está usando, incluyendo aquellos que usted ha adquirido sin receta. Se han descrito interacciones con: Colestipol, Colestiramina, Aceite mineral, Fenitoína, fenobarbital, suplementos de calcio, neomicina y tetraciclina.

REACCIONES ADVERSAS:

El uso de este medicamento puede producir efectos indeseables, que normalmente no requieren atención médica: molestias gástricas, náuseas, vómito, sabor metálico, sequedad bucal.

Si se presenta alguna de las siguientes reacciones adversas mientras esté en tratamiento con este producto consulte a su médico: dolor de cabeza, pérdida del apetito, cansancio, debilidad no habitual, reacción alérgica.

PRECAUCIONES:

Usar con precaución en pacientes con insuficiencia renal crónica, arterioesclerosis, alteración de la función cardíaca e hiperfosfatemia (altos niveles de fosfato) y en pacientes con gota. La vitamina C presente en la formulación puede interferir con exámenes de laboratorio clínico (determinación de la glicemia). Este producto contiene azúcar, precaución en diabéticos.

DOSIS:

El médico debe indicar la posología y el tiempo de tratamiento apropiados a su caso particular.

No obstante, la dosis usual recomendada es:

~~Niños hasta 2 años, 6 gotas. Niños mayores, según prescripción médica.~~

Dosis diarias preventivas:

0 a 1 año = 8 gotas;

1 a 6 años = 10 gotas;

7 a 10 años = 15 gotas

mayores de 10 años = 24 gotas.

FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PACIENTE

**FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE
VITAMINA ADC SOLUCIÓN PARA GOTAS ORALES**

La solución puede mezclarse con agua u otros alimentos líquidos, o bien administrarse directamente en la boca.

El médico evaluará la duración del tratamiento.

MODO DE EMPLEO:

Administrar por vía oral. La solución se puede mezclar con agua u otros alimentos líquidos o bien se puede administrar directamente en la boca.

SOBREDOSIS:

Signos tardíos de toxicidad por vitaminas A y D: dolores articulares y óseos, orina turbia, aumento de la sensibilidad a la luz e irritación ocular, dolor abdominal severo, alteración mental. En caso de sobredosis accidental, trasladar a la persona afectada a un centro asistencial de urgencia para observación y tratamiento de los síntomas si se presentan.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Mantener lejos del alcance de los niños; en su envase original; protegido del calor, **a no más de 25°C.**

No use este producto después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

No repita el tratamiento sin indicación médica.

No recomiende este medicamento a otra persona.

LABORATORIO CHILE S.A.

Santiago-Chile

www.laboratoriochile.cl

**FOLLETO DE INFORMACIÓN
AL PACIENTE**