

FICHA PRODUCTO

Descripción Producto

Registro	: F-9773/21
Nombre	: CIBLEX COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 30 mg
Referencia de Tramite	:
Equivalencia Terapéutica o Biosimilar	: EQUIVALENTE TERAPÉUTICO
Titular	: LABORATORIOS LAFI LTDA.
Estado del Registro	: Vigente
Resolución Inscribase	: 10894
Fecha Inscribase	: 13/12/2001
Ultima Renovación	: 13/12/2021
Fecha Próxima renovación	: 13/12/2026
Régimen	: Fabricación Nacional
Vía Administración	: ORAL
Condición de Venta	: Receta Simple
Expende tipo establecimiento	: Establecimientos Tipo A Y Asistencial
Indicación	: Tratamiento de episodio de depresión mayor.

Envases

Tipo Envase	Descripción Envase	Período Eficacia	Condición Almacenamiento	Contenido	Unidad Medida
Muestra Médica	Blister pack compuesto por lamina de PVC lechoso/ aluminio impreso ó PVC/PCTFE (aclár) ámbar /aluminio impreso.	36 Meses	Almacenado A No Más De 30°c	7,14,15 ó 30	COMPRIMIDOS RECUBIERTOS
Venta Público	Blister pack compuesto por lamina de PVC lechoso/ aluminio impreso ó PVC/PCTFE (aclár) ámbar /aluminio impreso.	36 Meses	Almacenado A No Más De 30°c	10-60	COMPRIMIDOS RECUBIERTOS

Función Empresa

Función Empresa	Razón Social	País
CONTROL DE CALIDAD	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	CHILE
DISTRIBUIDOR	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	CHILE
FABRICACIÓN NACIONAL TERMINADO	LABORATORIOS RECALCINE S.A.	CHILE

Fórmula (sólo Principios Activos)

Nombre PA	Concentración	Unidad Medida	Parte
MIRTAZAPINA	30,00	mg	Núcleo:

Instituto de Salud Pública de Chile

Av. Marathon 1000
Ñuñoa, Santiago
Casilla 48 Correo 21
Código Postal 7780050

Mesa Central
(56-2) 5755 101
Informaciones
(56-2) 5755 201

Contacto con OIRS
Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias

CIBLEX

ABBOTT

Antidepresivo.

Composición.

Comprimidos *Snap-On* recubiertos de 15 mg y 30 mg.

Indicaciones.

Tratamiento de depresión. Antidepresivo.

Dosificación.

Vía de administración: oral. La dosis de inicio recomendada para Mirtazapina es de 15 mg/día, administrada en una sola dosis, de preferencia antes de ir a dormir. Los pacientes que no respondan con 15 mg/día pueden beneficiarse al incrementar la dosis hasta un máximo de 45 mg/día. Debido a que la vida media de eliminación de Mirtazapina es aproximadamente 20 a 40 horas, no se recomienda efectuar cambios en la dosificación en intervalos inferiores a una o dos semanas, con el objeto de otorgar el tiempo suficiente para la evaluación de la respuesta terapéutica a una dosis determinada.

Presentación.

Env. con 30 comprimidos *Snap-On* recubiertos con 15mg. Env. con 30 comprimidos *Snap-On* recubiertos con 30mg.

