



# LABORATORIO BENGUEREL LTDA.

## PROYECTO DE ROTULADO GRAFICO

### CEFADROXILO SUSPENSION ORAL

#### VIII.- Rotulado gráfico de estuches :

##### cara n° 1 :

CE F A D R O X I L O

250 mg/5 ml

Polvo para suspensión oral

Cefalosporina oral de amplio espectro antibacteriano

Laboratorio Benguerel Ltda.

Instituto de Salud Pública  
Departamento de Control Medicinal  
Sección Registro de Especialidades Farmacéuticas

##### cara n° 2 :

CE F A D R O X I L O

Cada 5 ml de suspensión *reconstituido* contiene :

Cefadroxilo : de anhidra (*como monohidrato*) 250 mg.

Excipientes c.s.

Registro I.S.P.

Venta bajo receta médica en  
Establecimientos tipo ....

Administración y dosis  
según prescripción médica.

Elaborado en Chile para  
Laboratorio Benguerel Ltda.  
por Laboratorios Andrómaco Ltda.  
Av. Vicuña Mackenna 3451 - Stgo.

VENTA BAJO RECETA  
EN FARMACIA  
TIPO A

3347-B



# LABORATORIO BENGUEREL LTDA.

Instituto de Salud Pública  
Departamento de Control Nacional  
Sección Registro de Especialidades Farmacéuticas

cara n° 3 :

CEFADROXILO

250 mg/5 ml

Preparación de la suspensión reconstituida

Agítese el frasco para aflojar el polvo. Agregue 45 ml de agua recién hervida y fría, inviértase el frasco y agítese. *En el vaso queda gáduado*  
Se obtiene un volumen total de 60 ml

Consérvese en lugar fresco.

Una vez preparada la suspensión debe usarse antes de 7 días si se conserva a temperatura ambiente, o de 14 días si se mantiene en el refrigerador.

Para uso oral

VENTA P  
EN 5...  
TIPO A

cara n° 4 :

CEFADROXILO

60 ml

cubierta superior :

CEFADROXILO

~~transición~~

250 mg/5 ml

Polvo para suspensión oral  
*Fresco de 60 ml*

cubierta inferior :

Serie :

Vence :

Precio :

3347-B



# LABORATORIO BENGUEREL LTDA.

Rotulado gráfico de etiquetas :

C E F A D R O X I L O

Polvo para suspensión oral  
250 mg/5 ml

Preparación :

Agítese el frasco para aflojar el polvo. Agregar 45 ml de agua recién hervida y fría, inviértase el frasco y agítese. *con el vaso medidor graduado.*

Registro I.S.P.

Una vez preparada la suspensión debe usarse antes de 7 días si se mantiene a temperatura ambiente, o de 14 días si se mantiene en refrigerador.

Serie :

Vence :

Elaborado en Chile para  
Laboratorio Benguerel Ltda.  
por Laboratorios Andrómaco Ltda.  
Av. Vicuña Mackenna 3451 - Stgo.

