




Cerciora^T

Levonorgestrel 0,75 mg

2 comprimidos - Vía oral.

B Bioequivalente



Lote: LF16856D

Elab.: 05/2019

Vence: 05/2022

Cerciora T - Levonorgestrel 0,75 - 2 Comprimidos

Cada comprimido contiene: Levonorgestrel 0,75 mg.

Excipientes c.s.: Celulosa microcristalina, Lactosa monohidrato,
Poloxámero 188, Croscarmelosa sódica, Estearato de Magnesio.

Reg. I.S.P. N°F-22468





Fabricado por: Laboratorios León Farma S.A. Polígono Industrial
Navatejera c/ La Vallina s/n, León, Villaquilambre.

Importado por: Exeltis Chile S.p.A. Avda. Príncipe de Gales
N° 5921 Of. 1902, piso 19°, La Reina, Santiago de Chile.

Acondicionado por: Laboratorio Novofarma Service S.A.
Av. Víctor Uribe N°2300, Quilicura, Santiago.

Distribuido por: Novofarma Service S.A. Av. Víctor Uribe
N°2280, Quilicura, Santiago, Chile.

Venta directa en establecimientos Tipo A y B.

Vía oral. Almacenar a no más de 25°C.

Ver inserto adjunto.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Mayor información en www.ispch.cl



Indicación: Está indicado como anticonceptivo de emergencia dentro de las 72 horas siguientes de haber mantenido relaciones sexuales sin protección, en caso de violación o cuando falla el método anticonceptivo utilizado.

Posología: Debe tomarse 1 comprimido tan pronto como sea posible, preferiblemente dentro de las 12 horas, y no más tarde de 72 horas, tras haber mantenido relaciones sexuales sin protección (véase apartado 5.1). Tras un periodo de 12 horas debe tomarse el segundo comprimido. Si ocurren vómitos dentro de las tres horas siguientes a la toma de los comprimidos, deben tomarse, otros dos comprimidos inmediatamente. Cerciora T comprimidos 0,75 mg puede tomarse en cualquier momento del ciclo menstrual, a menos que se haya producido un retraso de la hemorragia menstrual. Tras la utilización de la anticoncepción de urgencia se recomienda utilizar un método de barrera (ej.: preservativo, diafragma o capuchón cervical) hasta el inicio del siguiente ciclo menstrual. La utilización de Cerciora T no contraindica la continuación de la anticoncepción hormonal regular.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al principio activo o a alguno de los excipientes. Insuficiencia hepática grave, diagnóstico o sospecha de embarazo, sangramiento vaginal anormal de origen desconocido.

Advertencias y precauciones especiales de empleo: La anticoncepción de urgencia es un método de uso ocasional. En ningún caso debe sustituir a un método anticonceptivo convencional. La anticoncepción de urgencia no evita el embarazo en todos los casos. Si no existe certeza sobre el momento en que se produjeron las relaciones sexuales sin protección o si dichas relaciones tuvieron lugar hace más de 72 horas en el mismo ciclo menstrual, se debe considerar la posibilidad de embarazo. Si se mantiene una relación sexual durante el tratamiento con Cerciora T, la prevención del embarazo puede no ser eficaz. Deberá descartarse un posible embarazo si la menstruación se retrasa más de 5 días o se produce una hemorragia distinta a la habitual en la fecha prevista para la regla por cualquier otro motivo.



Bioequivalente